

## Агрометеорологична прогноза за месец май

Автор(и): Растителна защита  
Дата: 17.05.2020 Брой: 5/2020



През първото десетдневие на май развитието на земеделските култури ще се осъществява с умерени темпове, при средноденонощни температури близки до климатичните норми. В началото на май очакваните валежи ще бъдат решаващи за оцеляването на част от зимните житни култури в Североизточна България. В края на април на много места в североизточните райони нивото на влагозапасите при пшеницата в 50cm и 100cm почвен слой бе необичайно ниско за сезона, под 55-60% от ППВ - следствие от поднормените валежи през първата половина на пролетта. Поради тази причина част от посевите с пшеница са в критично състояние. Повреди, пожълтяване на листната маса (до 50 - 60%), вследствие дефицита на почвена влага са констатирани при пшеницата в агростанците Силистра и Царев брод.

През първото десетдневие на май при пшеницата и ечемика в полските райони ще се наблюдава фаза изкласяване.

В края на първото и през второто десетдневие се прогнозира повишение на температурите и ускоряване на вегетацията при зимните житни култури и засетите пролетници. През този период при пшеницата ще протича цъфтеж, оплождане и формиране на зърното.

През третото десетдневие агрометеорологичните условия ще се определят от неустойчиво и хладно за периода време. Очакваните значителни валежи ще бъдат от изключително важно значение за зимните житни култури, при които ще се осъществява наливане на зърното. В края на май част от посевите с ечемик и пшеница на места в южните райони ще встъпят във фаза млечна зрелост.

През месеца при царевичката и слънчогледа ще протича листообразуване. В края на третото десетдневие при слънчогледа, засят в агротехнически срок, ще се наблюдава образуване на съцветие.

При овощните култури ще се осъществява формиране и наедряване на завръзките. При лозата ще се наблюдава отделяне на реса, а в края на месеца - и фаза цъфтеж.

Честите валежи през май ще създават благоприятни условия за развитието на редица гъбни болести: мана по лозата и зеленчуковите култури; струпяване по семковите овощни видове, ранно кафяво гниене и съчмянкa по костилковите овощки; ръжди (жълта, кафява) и фузариоза по зимните житни култури.

По-подходящи условия за провеждане на растителнозащитните пръскания ще има през втората половина от първото и през повечето дни от второто десетдневие.

През май критични минимални температури за земеделските култури не се прогнозират, но остава повишена вероятността за градушки. При повреди от градушка е препоръчително засегнатите култури при първа възможност да се третират с медсъдържащи фунгициди за по-бързо калциране на раните и намаляване риска от вторични зарази.

*Източник НИМХ*