

Система за контрол на вредителите по лук

Автор(и): Растителна защита
Дата: 04.05.2021 Брой: 5/2021



Вредител – Лукова муха *Delia antiqua*

Повреда

Излюпените ларви се вгризват в основата на листата, изгризват ход в стъблото и се придвижват в луковицата. Повредените растения изостават в растежа, пожълтяват, полягат, лесно се отскубват и накрая изсъхват. В резултат на повредата тъканите ферментират и излъчват неприятна миризма на гнил лук.

Контрол

Начало на летеж на мухите се очаква през втората десетдневка на месец април. Нападнатите растения веднага да се извадят и унищожат. Първото третиране да се проведе в периода на масов летеж, който съвпада с цъфтежа на вишните. Праг на икономическа вредност: 5 бр. мухи/10 откоса с ентомологичен сак.

Вредител – Тютюнев трипс *Thrips tabaci*

Повреда

Трипсът смуче сок от листата и по тях се появяват белезникави петна. При силно нападение петната се сливат и целият лист побелява. По петната могат да се забележат и малки черни точки – екскрементите на неприятеля.

Контрол

През април да се обърне внимание на тютюневия трипс още в началото на неговата поява, когато преминава от растителните остатъци или плевелите по лука.

Вредител – Мана Peronospora destructor

Повреда

По листата се появяват хлоротични до светлозелени, елипсовидни петна, които при влажно време се покриват с виолетов спороносен налеп. Благоприятни условия за заразяване се създават при температура 3–25 °C и задържане на капки вода върху растенията.

Контрол

Ликвидиране на самораслите и първично болните растения. При откриване на първи петна от болестта да се проведат вегетационни третираня. В периоди със сухо време третиранията могат да се извършват по-рядко.

При третиране на луковите култури да се прибавя прилепител!