

Как ще си решите проблема с недостига на скъпите азотни торове при пшеницата? (Част III)

Автор(и): Растителна защита
Дата: 05.02.2022 Брой: 2/2022



Много по-бързо, отколкото можете да си представите!

Нутрибио N – уникална органична ВП формулация със срок на годност 4 години.

Следвайки тенденцията за ограничаване на азотното торене в световен мащаб, фирма „Меди плюс Р“ ООД предлага на фермерите *Нутрибио N* – един изцяло биологичен продукт, отговарящ на промените на пазара и нуждата от природно съобразни решения.

При употребата на *Нутрибио N* намаляваме с 35 - 40% употребата на азот съдържащите торове. В следствие на това се намаляват емисиите на въглероден двуокис, намалява се и замърсяването на водите с нитрати.

Представете си влиянието върху логистиката – намалява се обема на транспортирането на хиляди тонове азот съдържащи торове с камиони, работна сила и разходи за съхранение и приложение. Употребата само на 5 г/дка от *Нутрибио N* ефективно поддържа максимално ниво на добив, въпреки

химичното намаляване на азота (N), което в много случаи дори превъзхожда стандартното торене.

В случай, че сте пропуснали да научите:

Първа част на статията ще откриете тук:

Как ще си решите проблема с недостига на скъпите азотни торове при пшеницата? (Част I)

Технология - Пшеница		
 Намалени норми на азотно торене при внасяне на азотния тор в 3 срока  		
1 Нормална предсеитбена торова норма 1/3 от цялата торова норма	2 1 ^{ва} Пролетно подхранване Фаза братене (Февруари - Март) 1/3 от цялата торова норма	3 2 ^{ва} Пролетно подхранване (Март - Април) <i>не се прави</i>
Начин на приложение: м. Март: Хербицид + Амалгерол Есенс 200 мл/дка + Нутрибио N 5 г/дка м. Април: Фунгицид + Амалгерол Есенс 200 мл/дка		
Спестяват се ~ 20-30 кг Амониева Селитра		

Използването на биостимулатори и азотфиксиращи бактерии за регулирането на растежа и развитието на културите ще стане основна практика за получаването на екологично чиста растителна продукция в условията на климатични промени и в контекста на „Зелената сделка“. Тяхното приложение щади околната среда и спомага за по-добро усвояване на хранителните вещества от корените в почвата. Спазването на фазите на приложение е наложително за тяхната ефективност.

Втора част на статията ще откриете тук:

Как ще си решите проблема с недостига на скъпите азотни торове при пшеницата? (Част II)

Технология - Пшеница	
 Намалени норми на азотно торене при внасяне на азотния тор в 2 срока  	
1 Нормална предсеитбена торова норма 1/3 от цялата торова норма	2 Пролетно подхранване Фаза братене (Февруари - Март) Внася се мах. половината 20-25кг от предвидените 2/3 (50 кг)
Начин на приложение: м. Март: Хербицид + Амалгерол Есенс 200 мл/дка + Нутрибио N 5 г/дка м. Април: Фунгицид + Амалгерол Есенс 200 мл/дка	
Спестяват се ~ 25-30 кг Амониева Селитра	

Запомнете!

Само с 50 гр. **Нутрибио N** спестявате 300 кг Амониев нитрат или 200 кг Карбамид



Видео материал със споделен опит от Италия с Нутрибио N:

<https://www.youtube.com/watch?v=82mFAkTYC9I&t=3s>