

## Защо не трябва да пропускаме пролетното третиране на пшеница с Амалгерол Есенс?

Автор(и): Растителна защита  
Дата: 19.02.2022 Брой: 2/2022



Кореновата система има много важна роля в развитието на младите растения. Известен факт е, че наличието на силна такава позволява на младо поникналата пшеница да усвоява най-балансирано и в най-висока степен водата и хранителните вещества от почвата. Наличието на по-добре развита коренова система спомага за по-доброто преодоляване на стресовите условия, на които са подложени растенията.

Есента на 2020-та година, в някои части на страната, беше благоприятна за есенни третирания на пшеницата. Такъв е и случаят при земеделски производител от региона на град Видин. Той е направил есенно третиране на пшеницата си с биостимуланта **Амалгерол Есенс**. Приложената доза е 200 мл/дка в комбинация с инсектицид. В съседство на неговото поле има засята пшеница в същият ден. При направеното сравнение между двата посева, в средата на февруари 2021г., ясно се вижда предимството на пшеницата, подхранена с **Амалгерол Есенс**. Растенията, които са третирани имат ясно изразена и добре оформена коренова система с формирани два пъти повече братя. **Амалгерол Есенс** е помогнал на растенията да презимуват по-добре и да се справят с капризите на времето.

Голяма част от българските фермери, които се стремят към високи добиви на пшеница (над 700-800 кг. от декар) и към по-високо съдържание на глютен при хлебните сортове, имат създадена традиция за есенно третиране с **Амалгерол Есенс**.

За тази част от фермерите, които поради една или друга причина не са успели да го направят през есента, е задължително да помислят за такова през пролетта. Причините, които водят до невъзможност да се проведе есенно третиране най-често са късно поникване на пшеницата през есента или есенни дъждове. През пролетния период, след традиционното подхранване на пшеницата с азотсъдържащи торове, е необходимо третирането с хербицид да се комбинира с **Амалгерол Есенс**. Това е оптималния вариант, който ще позволи на растенията да усвоят по-голям процент от азота и ще доведе до развитието на по-мощна коренова система, която ще позволи оптимално асимилиране на хранителните вещества.




Приложението на биостимулатори и азот фиксиращи бактерии позволява намаляване на минералното торене без това да намали добива и качеството на продукцията, като в същото време поддържа нивото на нитратите под ограниченията, наложени от регламентите на ЕС в контекста на „Зелената сделка“. Тяхното приложение щади околната среда и спомага за по-добро усвояване на хранителните вещества от корените в почвата. **Амалгерол Есенс и Нутрибио N** – една отлична комбинация и симбиоза между два продукта, която има възможността за фиксиране на атмосферния азот. Спазването на фазите на приложение е наложително за тяхната ефективност.

| Технология - Пшеница                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Намалени норми на азотно торене при внасяне на азотния тор в 3 срока</b>   |                                                                                                                                      |                                                                                                |
| <b>1</b><br><b>Нормална</b> предсеитбена торова норма<br><b>1/3</b> от цялата торова норма                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2</b><br><b>1<sup>ва</sup></b> Пролетно подхранване<br>Фаза <b>братене</b> (Февруари - Март)<br><b>1/3</b> от цялата торова норма | <b>3</b><br><b>2<sup>ра</sup></b> Пролетно подхранване<br>(Март - Април)<br><b>не се прави</b> |
| <b>Начин на приложение:</b><br>м. Март: Хербицид + <b>Амалгерол Есенс</b> 200 мл/дка + <b>Нутрибио N</b> 5 г/дка<br>м. Април: Фунгицид + <b>Амалгерол Есенс</b> 200 мл/дка                                                                                                                                                               |                                                                                                                                      | <b>Спестяват се</b> ~ 20-30 кг Амониев Нитрат (Амониева Селитра)                               |

В зависимост от климатичните условия в различните региони на страната азотното торене при пшеницата се осъществява в 2 или в 3 срока.

| Технология - Пшеница                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                      |                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Намалени норми на азотно торене при внасяне на азотния тор в 3 срока</b>   |                                                                                                                                      |                                                                                                |
| <b>1</b><br><b>Нормална</b> предсеитбена торова норма<br><b>1/3</b> от цялата торова норма                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2</b><br><b>1<sup>ва</sup></b> Пролетно подхранване<br>Фаза <b>братене</b> (Февруари - Март)<br><b>1/3</b> от цялата торова норма | <b>3</b><br><b>2<sup>ва</sup></b> Пролетно подхранване<br>(Март - Април)<br><b>не се прави</b> |
| <b>Начин на приложение:</b><br>м. Март: Хербицид + <b>Амалгерол Есенс</b> 200 мл/дка + <b>Нутрибио N</b> 5 г/дка<br>м. Април: Фунгицид + <b>Амалгерол Есенс</b> 200 мл/дка                                                                                                                                                         |                                                                                                                                      | <b>Спестяват се</b> ~ 20-30 кг Амониев Нитрат (Амониева Селитра)                               |

Най-убедително доказателство за ефикасността от приложението на продукта са отзивите на фермерите, които се довериха на **Амалгерол Есенс**.



Денис Бистъров - Земеделски производител - гр. Видин

През пролетта на 2021г. използвахме **Амалгерол Есенс** при пшеница. Приложихме го във фазата на братене в комбинация с хербицид. Ефекта на продукта се появи почти мигновено, на 2-3 ден след третирането забелязахме драстична промяна в състоянието на културата. Средния добив от декар се повиши с около 60 кг. Тази есен го приложихме отново във фаза 3-ти лист на културата за стимулиране на братенето и по-добро презимуване на пшеницата. Препоръчвам **Амалгерол Есенс** на всички колеги, защото съм убеден в неговия резултат! **Амалгерол Есенс** се справя много добре при стресови ситуации: студ, слана и хербициден стрес!



Георги Иванов | Геоагрозем ЕООД | с. Камен, обл. Сливен

Правили сме опити с много продукти и можем да твърдим, че биостимуланта **Амалгерол Есенс** превъзхожда всички останали. Посевите ни от пшеница бяха подгоряли всичките, като след третирането им с продукта имаше пълно възстановяване. Много бърз и видим ефект. Средния добив се покачи с 40 кг/дка спрямо другите продукти, които използвахме. Не само ще продължи, но и ще увеличи третираната площ с **Амалгерол Есенс**!

Екипът на Институт по Растителни и Генетични Ресурси - Садово и МеДи Плюс Р ООД препоръчва на българските фермери да инвестират в пролетното третиране на пшеницата с **Амалгерол Есенс** и **Нутрибио N**, което ще им осигури по-силни и здрави растения.

Запомнете начина на приложение при пшеница:

През м. Март: Хербицид + **Амалгерол Есенс** 200 мл/дка + **Нутрибио N** 5 г/дка

През м. Април: Фунгицид + **Амалгерол Есенс** 200 мл/дка

Това в никакъв случай няма да бъде разход, а сигурна инвестиция за по-висок и качествен добив!

**Комбинацията от двата продукта ще ви спести около 30 кг/дка Амониев Нитрат.**

Допълнителна информация и интересни материали и съвети за употребата на **Амалгерол Есенс** и **Нутрибио N** можете да откриете на следните линкове:

<https://youtu.be/NdnCZ5E2l0s?t=372>

<https://www.mediplusr.com/webinar/>