

Агротехнически дейности в овощната градина през юли

Автор(и): ас. Кирил Кръстев, Институт по декоративни и лечебни растения – София

Дата: 07.07.2024 Брой: 7/2024



През повечето дни от второто и третото десетдневие на юли се очаква относително сухо и много горещо време с максимални стойности на температурите между 35–40°C. Прогнозираните високи температури през юли и относително сухото време ще ограничават развитието на гъбните болести по трайните насаждения, с изключение на брашнестите мани. Очакваните валежи около и под нормата за месеца ще изискват прилагането на повишен поливен режим.

В овощните разсадници

Семенилищата се поливат и обработват редовно, за да се осигури възможно най-висок процент стандартен подложков материал. Маточните насаждения се напояват и при нужда се загърлят.

За да се осигурят условия за добро развитие на окулантите, в питомник втора година при необходимост се филизи. Редовно се обработват и напояват най-вече крушите.

В питомник първа година започва облагородяването на подложките, а при тези където пъпките не са се прихванали се окулира повторно. Около две седмици след окулирането се прави преглед на превръзките. Тези, които са се врязали, се разхлабват.

В овощните насаждения

Продължава работата по наклоняването на скелетните клони при формиране на палмета.

Чрез напояване почвената влажност се поддържа над 70 % от ППВ.

С дискова брана, култиватор, фреза и фреза с отклоняваща се секция почвената повърхност в междуредията и реда се поддържа в обработено състояние и чиста от плевели.



Продължава работата по беритба на череши и вишни, започва и масовата беритба на кайсии и праскови.

В ягодовите насаждения

Продължават грижите по напояването на новосъздадените ягодови насаждения, особено за засадените през юни. В по-ниските и топли райони, където беритбата на плодовете е приключила, сламата се събира, изнася се и се изгаря.



Продължава беритбата на плодовете в по-високите и хладни месторастения.

След изнасяне на сламата насажденията се напояват и се обработват, като предварително се наторяват с 10-12 кг амониева селитра на дка.

Маточните насаждения, от които ще се произвежда разсад се напояват, торят се с 15-20 кг амониева селитра на декар и се окопават. Ластуните в насажденията, от които не се взема разсад се изрязват.

Определят се новите площи за ягодови насаждения и се подготвят за есенно засаждане на открито. Преди дълбоката обработка площта се наторява с 2-4 т оборски тор, 60-80 кг суперфосфат и 20-30 кг калиев сулфат на декар.

В малиновите насаждения

Продължават грижите по напояването и обработването на новите насаждения. Напояват се и се обработват плододаващите насаждения. Поливната норма е 50-60 дм³ на декар.



Извършва се масова беритба на плодовете.

Полагат се грижи за маточните малинови насаждения – напояване и обработване, за да се осигури максимално количество посадъчен материал – издънки.

Насажденията се преглеждат, примесите от други сортове се почистват, а старите плододавали стъбла се изрязват, събират се и се изгарят.

В касисовите насаждения

Продължават грижите за вкоренилищата. Почвата се напоява и обработва, като в младите и плододаващи насаждения не се допуска заплевеляване.

Насажденията се торят с азот (1/3 от годишната норма).

Извършва се масова беритба на плодовете. По време на беритба се маркират примесите от други сортове, за да се изкоренят по-късно, както и болните и слаби растения. След беритбата се отстраняват счупените, недоразвитите и излишни издънки.

В насажденията с други култури

Маркират се желаните сортове и форми смокини за получаване на резници. Получават се резници от актинидия, дафиново дърво, арония, облепиха и нар за вкореняване в оранжерия с изкуствена мъгла. Формират се резниците, които се третират с разтвор на индолил-маслена киселина за 5 секунди. Третират се в оранжерии с изкуствена мъгла в субстрат от две части перлит и една торф.

Започва облагородяването на подложките от кавказка хурма с райска ябълка и семеначета на актинидия с културни сортове.

Продължава привързването на лианите на актинидията към телена конструкция. Провежда се лятна резитба на актинидията. Още със засаждането се поставя телена конструкция, а теловете се повдигат на 1-1,20 м и 1,80-2 м от почвата.

Окулират се хинапът и фисташката.

Берат се смокиновите плодове, а към края на месеца започва беритбата на плодовете на облепихата и аронията.