

Октомври – валежи със стопанско значение и добри условия за развитие на зимната рапица

Автор(и): Растителна защита
Дата: 06.10.2024 Брой: 10/2024



През октомври агрометеорологичните условия ще се определят от температури около и над климатичните норми и валежи близки до нормите за месеца. След лятното засушаване, падналите валежи със стопанско значение през септември, в отделни райони от Източна и на места в Западна България, подобриха овлажнението на горните почвени слоеве и условията за извършване на сезонните почвообработки.

Падналите валежи в края на септември бяха неравномерно разпределени. На много места в Централна и Североизточна България са регистрирани валежи до и над 30-35 l/m² (В.Търново - 40 l/m², Русе - 43 l/m², Разград - 36 l/m², Силистра - 45 l/m², Варна - 45 l/m², Добрич - 53 l/m²), което доведе до съществено подобрение на влагозапасите в горните почвени слоеве и на условията за провеждане на сезонните почвообработки. За разлика от централните и източните райони в част от Западна и Южна България валежите в началото на есента бяха без стопанско значение. В тези части от страната сухата и сбита почва сериозно възпрепятства провеждането на дълбока оран и предсеитбените обработки на площите, предвидени за засяване с есенници.

През повечето дни от първото десетдневие на октомври съществени валежи не се прогнозиарат и условията ще позволяват подготовка на площите и засяването им със зимни житни култури. Лятната суша възпрепятства навременната сеитба на зимна рапица и на места в полските райони от Централна България площите ще бъдат засети извън агротехнически срок. Твърде вероятно е късните посеви да не встъпят във фаза розетка през есенната си вегетация, която гарантира успешното презимуване на културата без повреди.

През октомври тежат оптималните агротехнически срокове за сеитбата на зимни житни култури. През първата половина от месеца са сроковете за Северна България, през втората половина на месеца за Южна България, а през третото десетдневие са сроковете за черноморските райони. Очакваните валежи в края на първото и началото на второто десетдневие както и през втората половина на третата декада от месеца ще са от важно значение за нормалното протичане на началните етапи от вегетацията на пшеницата и ечемика. През октомври в зависимост от датите на сеитба при пшеницата ще се наблюдават следните фази – поникване, първи и трети лист.



Прогнозираното топло време през втората половина на месеца ще бъде предпоставка за увеличаване популацията на обикновената полевка. Посевите с есенни култури трябва да се обследват и при достигане на икономическия праг на вредност да бъдат третираны – ПИВ-2 бр. активни колонии/дка.

Условия за работа на полето ще има в средата на второто и през първата половина от третото десетдневие, когато се прогнозира относително сухо време.



През октомври при нападнатите от струпясване ябълкови и крушови насаждения за редуциране на заразата е желателно в началото на листопада, след прибиране на плодовете, да се извърши третиране с 5% разтвор от карбамид.

При костилковите овощни видове, след масовия листопад, се препоръчва пръскане с 2% бордозелов разтвор срещу причинителите на сачмянка, ранно кафяво гниене, къдравост по прасковата.

В началото на октомври се прогнозира слани, което ще ограничи възможностите за допълнителна продукция от късните зеленчукови култури, подлежащи на осланяване.

Източник НИМХ