

## Агротехнически дейности в овощната градина през ноември

Автор(и): ас. Кирил Кръстев, Институт по декоративни и лечебни растения – София

Дата: 08.11.2024 Брой: 11/2024



### *В овощните разсадници*

Откриват се маточните растения в маточниците.

Всички – вкоренени и невякоренени издънки се изрязват с ножица или остър нож, колкото е възможно по-ниско. Ако маточните храсти са слаби, оставят се 1-2 издънки за тяхното засилване. След изрязване на издънките, майчините растения се покриват с почва за предпазване от зимни студове.

Изваждат се подложките от семенилищата след приключване на вегетацията на растенията.

Ако листата не са окапали, те се събарят с ръка или чрез пръскане с дефолианти – 0,1-0,2 % калциев хлорид, 0,4 % манганов хлорид и други.

Извършва се сортиране на подложките по БДС, като слабите, недоразвитите се и прераснали се отделят.

В питомник първа година се засаждат подложките.

Почвата трябва да бъде предварително добре подготвена. Разстоянията на засаждане зависят от овощния вид, обикновено 80 x 20 см, а за орех – 100 x 30 см. Семенните подложки се засаждат 1-2 см по-дълбоко от кореновата шийка, а вегетативните – на 20 см дълбочина, независимо от дължината на обраслата с корени част. След засаждане подложките се поливат и загърлят на височина 10 см, за да се запази влагата и по-сполучливо да се получи окулирането.

Останалите, незасадени в питомника подложки, се съхраняват до пролетта на запазено от ветровете място, отдалечено от стопански сгради. Корените се заравят с рохкава и влажна пръст и се заливат обилно с вода.

Засаждат се нови маточници.

Предпочита се лека, влагоемна, дълбоко обработена почва, наторена с 4-6 т оборски тор, 100-150 кг суперфосфат и 50-60 кг калиев сулфат на декар. Растенията се засаждат на разстояние 1,8 – 2 м между редовете и 35-60 см вътре в редовете и дълбочина 25-30 см. След засаждането надземната част се изрязва на около 20 см над земната повърхност.



Посяват се семената в семенилищата.

Почвата се наторява предварително с 4-5 т оборски тор на декар и се привежда до градинско състояние - изорава се на 30-35 см и се подравнява. Семената на ябълка и круша не се стратифицират предварително, а на дребните костилкови се стратифицират във влажен пясък в продължение на два месеца, за да се индуцират процесите на следберитбено доузряване.

Изваждат се, сортират се и се съхраняват овощните дръвчета.

Изваждането се извършва с тракторен плуг, хидравлична навесна уредба или специална скоба. Сортирането се извършва според изискванията на БДС, като се завързват на снопчета – по 25 броя, поставя се етикет с наименованието на сорта и вида на подложката. Дръвчетата се съхраняват на равно, отцедливо място, защитено от ветровете, далеч от стопанските постройки и сеновали и се поливат, за да може почвата добре да прилепне към корените.

Събират се резници за калеми за пролетно присаждане.

Обикновено резниците се вземат от южната част на короната на дърветата. Те се навързват на снопчета по 25 и се съхраняват във влажен пясък на сенчесто място в хладни избени помещения или в хладилни камери.

Полагат се грижи за стратифицираните семена.

В края на месеца започва подготовката за присаждане на маса.

#### *В овощните насаждения*



В младите овощни насаждения се отчита броят на пропадналите дръвчета и се изготвя план за попълване на празните места по видове и сортове. Ремонтират се телените конструкции и се изграждат нови. Продължава извозването и разхвърлянето на оборски тор.

При силно засушаване се провежда влагозапасяваща поливка с 60-80 м<sup>3</sup> вода на декар.

Започва зимната резитба за производство при семковите овощни видове.

Засаждат се овощните дръвчета в новите насаждения. При създаване на гъсти насаждения, вместо в посадъчни ямки, се препоръчва засаждане в бразди.

#### *В ягодовите насаждения*

Продължава изваждането, подготовката и съхраняването на ягодовия разсад в хладилници за пролетно-лятно засаждане.



При засушаване насажденията, създадени през септември или октомври, се поливат, а при наличие на плевели теренът се почиства.

В края на месеца се извършва влагозапасяваща поливка на старите насаждения.

Засаждат се растенията в отопляемите оранжерии за производство на ранни ягоди.

#### *В малиновите насаждения*

Посадъчният материал се изважда, сортира и се съхранява.



От производственото насаждение издънките се вадят ръчно с права лопата. От маточните насаждения на втора година всички годни за посадъчен материал издънки – без тези за апробация се изваждат ръчно. На третата година от маточните насаждения издънките се вадят с плуг или скоба. Издънките, предназначени за засаждане през пролетта, се съхраняват в бразди, засипани с почвен пласт 15-20 см над кореновата шийка. Почвата се притъпква и се залива обилно с вода. Създават се нови малинови насаждения.

#### *В касисовите насаждения*

Събират се зрели резници. Използват се едногодишни издънки от млади производствени или маточни насаждения. Издънките се нарязват на резници. Всеки резник трябва да има дължина от 20 до 25 см и дебелина над 5-6 мм. В основата резникът се отрязва на 2-3 мм под пъпка, а в горната част – до 1 см над пъпката.

Вкореняват се резниците.



В реда резниците се поставят на 15-20 см разстояние, наклонени, близо до ъгъл 45, в почвата. Когато почвите са леки те се набучват, а на тежки почви се засаждаат със садило. Най-горната пъпка се оставя под почвената повърхност. След засаждането почвата около резниците се притъпква.

Изважда се, сортира се и съхранява посадъчният материал.

Вкоренените растения се изваждат ръчно или механизирано в началото на месеца, но не при температури по-ниски от 0 °C. Определените за пролетно засаждане растения се съхраняват в бразди или канавки, дълбоки 45-50 см. Корените им се зариват, почвата се притъпква и се залива обилно с вода. Вземат се мерки за предпазване от мишки.

Създават се нови касисови насаждения. Извършва се резитба на храстите за плододаване.

#### *В насажденията с други култури*

Събират се резници от смокиня за вкореняване.

За вкореняване се използват едногодишни клончета с дебелина 1-1,8 см, с къси междувъзлия. Резниците се оформят с дължина 25-26 см. Долният отрез се прави непосредствено под възела, а горният – на 1 см над добре развита странична пъпка. Резниците се навързват на снопчета по 50, етикетират се, заравят се в пясък в хладни помещения или на открито, в плитки – до 25 см трапчета.

Събират се резници от нар за вкореняване.

Те трябва да са от едно- или двегодишни клонки. Дължината на резниците е 20-25 см, а дебелината при основата – от 0,5 до 1,2 см. След нарязване клонките се почистват от бодли и странични клончета, оформят се резници с дължина 20-25 см. Връзват се на снопчета и се етикетират. Съхраняват се на хладно място във влажен пясък или в канавки на открито. Вземат се мерки за предпазване от изсушаване.

Събират се резници от облепиха за вкореняване. По същият начин като при нар.

Събират се семена от дафиново дърво.

Семената се почистват от околоплодника. Съхраняват се в леко навлажнен пясък в хладни мазета или на открито. В по-топли райони семената се засяват на открито веднага след почистването. Засяват се в семенилището на 4-5 см дълбочина, на разстояние 20 см – между редовете и 5 см – вътре в реда. Семената се покриват с пясък или други мулчиращи материали.

Събират се семена от кавказка хурма, почистват се, изсушават се на сенчесто място и се съхраняват в хладни помещения, смесени с навлажнен пясък или зеолит.

Продължава събирането на семена от кукуч, които ще се използват за производство на подложки за фисташка.

При наличие на топло помещение се засяват лимоновите семена и семената от трифолиата в сандъчета, щайги и др.

Почвената смес е съставена от една част почва, две части пясък и една част угнил оборски тор. Редовно се навлажнява.

Засаждат се нарът, смокинята, райската ябълка, дафиновото дърво и облепихата, като площите първо се маркират.

Засаждат се на следните разстояния – смокиня – 5х5 м, нар – 4х4 м, райска ябълка – 5х5 м, дафиново дърво – 3х0,8 м, облепиха – 4х2,5 м.

Вкоренените резници от нар, смокиня, облепиха и едногодишните облагородени дръвчета от райска ябълка се изваждат на открито.

Берат се плодовете от нар и райска ябълка. Започва резитбата за плододаване на райска ябълка. Извършва се резитба на смокинята.

Започва прибирането на изсъхналите дафинови листа от орязаните леторасти.

Провежда се зимна резитба на актинидията (киви). Премахват се съгъстващите леторасти, подменят се изтощените кордони, премахва се застарялата плодна дървесина. Приключват беритбата и съхраняването на плодовете от актинидия. Залагат се за доотглеждане вкоренените резници от актинидия.