

Неравномерно разпределените валежи в страната водят до различия във фенологичното състояние на зимните житни култури

Автор(и): Растителна защита

Дата: 20.11.2024 Брой: 11/2024



До края на второто и началото на третото десетдневие на ноември те ще се определят от средноденоношни температури над климатичните норми и над биологичния минимум, необходим за вегетацията на зимните житни култури

През периода съществени валежи и промяна в нивата на есенните влагозапаси не се очаква. Падналите валежите през изтеклия период са неравномерно разпределени. На много места в северозападните райони, в Горнотракийската низина и в крайните южни части на страната са регистрирани валежи под $10-12\text{ l/m}^2$ - крайно недостатъчни за преодоляване дефицита на влага при зимните житни култури.

В част от източните райони (Разград, Русе, Силистра, Сливен, Карнобат) паднаха значителни валежи - над $25-30\text{ l/m}^2$. В тези райони настъпи подобрение на влагозапасите в горните почвени слоеве и на условията за вегетация на есенните посеви.

Докато в страната октомври и началото на ноември бяха периоди на засушаване и липса на стопански валежи, то в Добчрика област се наблюдават достатъчни влагозапаси, които спомагат за доброто развитие на посевите с пшеница. Температурите позволяват нормално поникване при достатъчна влага. По-ниските температури в Добруджа предпазват посевите с есенници от нападения на вредители, като житни мухи и листни въшки.

През периода при пшеницата ще се наблюдават различни фази – покълване, поникване (агروстанциите: Кнежа, Николаево, Казанлък, Пловдив, Хасково, Ямбол) и формиране на 1-2 и 3 лист (Новачене). Различията във фенологичното състояние на зимните житни култури са вследствие продължителното есенно засушаване и закъснелите сеитби.

През периода условията ще бъдат подходящи за засаждане на овошки и за провеждане на фитосанитарни дейности при овощните култури.

Източник НИМХ