

Април – неустойчиво време и валежи със стопанско значение

Автор(и): Растителна защита
Дата: 03.04.2025 Брой: 4/2025



През април агрометеорологичните условия ще бъдат с повишена динамика. През повечето дни от месеца те ще се определят от неустойчиво време. Очакваните валежи, около и над климатичните норми, ще поддържат добри почвените влагозапаси в 50cm слой и условията за вегетация на зимните житни и засетите пролетни култури. Това посочват в прогнозата си за месеца агрометеоролозите от НИМХ.

През първата половина на април вегетацията на земеделските култури ще протича при средноденонощни температури около и под климатичните норми. През първото десетдневие пшеницата в полските райони ще встъпи във фаза вретенене.

През второто десетдневие се прогнозираат отрицателни минимални температури до минус 2-3°C и повишен риск за повреди по цветовете и младите завръзи на овошките. Последните пролетни слани се очакват в края на десетдневие, което трябва да се има предвид при закаляване на зеленчуковия разсад.

Септориози при зимната пшеница

Повишение на среднотенощните температури и ускоряване темповете на развитие на земеделските култури се прогнозира в края на второто и през третото десетдневие. През този период при пшеницата ще протича преход от фаза вретене към изкласяване и фаза изкласяване. Междуфазният период вретене – изкласяване е критичен за заразяване на зимните житни култури със септориоза.



Посевите с пшеница трябва да се обследват и за наличие на вредители - обикновената житна пиявица, житната дървеница и при плътност над прага на икономическа вредност е необходимо своевременно третиране.



Струпяване по ябълка

Честите валежи през месеца ще бъдат предпоставка за повишение на инфекциозния фон от редица гъбни болести по овошките - ранно кафяво гниене, струпяване, сачмянкa, къдравост по прасковата и др.. През първата половина от третото десетдневие се прогнозира повишена вероятност за градушки. Засегнатите от градушка овошки при първа възможност трябва да се третират с медсъдържащи фунгициди за ограничаване на риска от вторични зарази с патогени.

През април по-подходящи условия за провеждане на растителнозащитни пръскания ще се създават в началото и в края на второто и през втората половина от третото десетдневие.

В началото на третото десетдневие температурата на почвата в 10cm слой ще достига подходящи стойностите за сеитбата на царевица, а в края април – и за топлолюбивите пролетни култури (памук, фасул, фъстъци, дини, пъпеши и др.).