


Агротехнически дейности в овощната градина през май

Автор(и): ас. Кирил Кръстев, Институт по декоративни и лечебни растения – София

Дата: 07.05.2025 Брой: 5/2025



През май агрометеорологичните условия ще се определят от неустойчиво време, с температури и валежи близки до климатичните норми за месеца. През месеца при овощните култури, незасегнати от пролетните студове, ще се осъществява формиране и наедряване на завръзките.

Средната температура през май ще бъде около и над нормата, която е между 24 и 25 °С в повечето райони, 20-23 °С по Черноморието и между 5 и 15 °С в планините.

Месечната сума на валежите ще е средна за страната и ще бъде около и под нормата, която за равнините е между 50 и 70 л/кв. м., а в планинските райони - между 80 и 100 л/кв. м.

Над Западна България и Централна България се очакват количества, близки до климатичната норма от 60-90 л /кв.м. Доста по-малка е вероятността за валежи е в Източна България, като времето ще е по-често слънчево и малко по-сухо. Очакваните валежи там ще бъдат под климатичните норми – до 35-40 л/кв.м.

До края на първото десетдневие дневните стойности ще достигнат 28-33 °C, а на места и до 35 °C, като така ще се ускорят вегетационните процеси при овощните култури. Ще има много слънчеви часове и валежи от дъжд в следобедните часове и то предимно над планините.

През първото десетдневие на месеца предимно в Западна и Централна България ще паднат значителни по количества валежи. Висока е вероятността и от градушки. Дневните температури ще са между 23-25°C, а над Източна България малко по-ниски – до 20-22°C.

Второто десетдневие ще започне с повече слънчеви часове. Температурите ще се задържат близки до обичайните. По-малка ще е вероятността от валежи в Източна България. Дневните температури ще са близки до нормалните за май и ще са между 25-29°C, а над Източна България – 24-25°C.

Към края на второто десетдневие на май се очакват слабо понижение и по-ниски температури. Отново атмосферата ще е нестабилна. Ще има условия за валежи, градушки и гръмотевични бури, а над 2000-2200 н. в и от сняг.

При повреди от градушка е препоръчително засегнатите култури при първа възможност да се третират с медсъдържащи фунгициди за по-бързо калциране на раните и намаляване риска от вторични зарази с патогени.

През първите дни от третото десетдневие времето ще е нестабилно и ще се задържи студено за периода. На много места следобед ще падат краткотрайни валежи с гръмотевици. До края на периода валежите ще намаляват, а температурите ще се повишават, което ще доведе до ускорено развитие на овощните култури. Очаква се и период на засушаване, като на по-малко места ще се наблюдават валежи. Дневните стойности ще са между 25-27 °C - до 23-24 май и 35-37 °C. - към края на месеца.

В овощните разсадници

В питомниците се следи за правилното развитие на присадените пъпки. При необходимост се извършва ново филизене на покаралите от подложката леторасли. При опасност от вливане превръзките на преприсадените през пролетта подложки се разхлабват. Семенилицата, маточниците и питомниците се обработват. При необходимост растенията в семенилицата се прореждат.

В овощните насаждения



В края на цъфтежа пчелните кошери се преместват на друго място – отдалечено на не по-малко от 5 км.

В новозасадените прасковени градини с чашовидна или подобрена чашовидна корона се прави резитба за формиране.



Полагат се грижи за правилно прихващане и развитие на дръвчетата в новозасадените градини – окопаване, филизене, поливане при необходимост. Дръвчетата в младите гъсти насаждения се привързват към телена конструкция. Силните две- и тригодишни клонки се наклоняват и привързват към теловете, за да се намали растежната им сила. В младите – 2 и 3-годишни насаждения част от завръзите по водача -централния клон се отстраняват. Продължава работата по прореждане плодовете на прасковата.

След окончателното завършване на опадване на завръзите насажденията се напояват. Органичната маса от културите за зелено торене се заорава.

Почвата се поддържа чиста от плевели и се разрохва чрез редовни плитки обработки с култиватор или брана.

В края на месеца плододаващите овощни дървета се подхранват с 15-20 кг/дка амониева селитра или същото количество друг азотен тор, след което се прави плитка почвообработка. При засушаване се напоява.



Продължава беритбата на ранните сортове череши.

В ягодовите насаждения

Продължава пролетно-лятното засаждане на ягодовия разсад, съхранен в хладилник. След засаждане се дъждува. Плевят се засадените през април площи. А в по-високите райони до края на месеца се постила слама под цветоносите.



Беритбата продължава. Когато плодовете се транспортират на по-дълги разстояния, те могат да се берат и малко по-рано.

При засушаване по време на зреене на плодовете е необходимо да се дъждува или напои гравитачно.

В малиновите насаждения

Извършват се редовни почвообработки. Издънките на някои сортове се привързват за опорната конструкция, а на останалите сортове се внимава те да не увиснат към междуредията. По време на цъфтежа е добре да се осигурят две пчелни семейства на всеки 10 дка.

В касисовите насаждения



Продължават грижите – обработка и напояване за вкоренилицата. Премахват се слабите и излишни прикоренови леторасли. При засушаване се прави обилна поливка. Започва работа по организацията на беритбата на касисовите плодове.

В насажденията с други култури

Лимоновите подложки се присаждат на будна пъпка. Продължава присаждането на райска ябълка.

Почвената повърхност се поддържа чиста от плевели и редовно се разрохва чрез плиткки обработки. До второто десетдневие се осигуряват чести и редовни поливки.



Продължава засаждането на *Actinidia chinensis* на открито. След засаждане се полива. Лианите на актинидията редовно се привързват към спомагателните подпорни клончета. Стъблото не бива да се увива около подпорното клонче и страничните леторасли по него се премахват. Осигуряват се по три пчелни семейства на 10 дка актинидия.