

Трипсове по домати и краставици

Автор(и): Растителна защита
Дата: 20.02.2017 Брой: 2/2017



По нападнатите органи на растенията (листа, листни дръжки, цветовете и плодове) се образуват малки белезникави петна с тъмни точки, екскрементите на неприятеля. При по-голяма плътност петната се сливат. В оранжерии вредят:

Тютюнев трипс *Thrips tabaci* – открива се най-вече по листната маса, по-рядко напада цветовете. Благоприятни условия за развитието му, са високи температури и ниска въздушна влажност.

Западен цвят (Калифорнийски) трипс *Franklinella occidentalis* – установено е, че по краставиците неприятелят предпочита цветовете. Генеративните органи на растенията (пъпки и завръзи), нападнати в ранните фази от развитието си, изсъхват и окапват.

Оранжев трипс *Heliothrips haemorrhoidalis* – ларвите и възрастните смучат сок от листата на растенията. Ниската относителна влажност на въздуха се отразява неблагоприятно върху жизнената дейност на популацията.

Стратегия за контрол на вредителя: Освен редовно обследването на растенията, за установяване наличието и плътността на неприятелите, да се поставят сини лепливи уловки.

Разрешени продукти за растителна защита:

- **срещу трипсове:** ДЕКА ЕК / ДЕША ЕК/ДЕНА ЕК - 30 мл/дка, КАРАТЕ ЕКСПРЕС ВГ /НИНДЖА /ФОРЦА - 42-80 г/дка, МЕТЕОР - 60-70 мл/100 л.вода и НАТУРАЛИС - 75-100 мл/дка.

- **срещу калифорнийски трипс:** ФЮРИ 10 ЕК - 0,015 %.

При домати: - **срещу трипсове:** ДИКАРЗОЛ 10 СП - 556 г/дка.

- **срещу калифорнийски трипс:** СИНЕИС 480 СК - 10-37,5 мл/дка.

При краставици: - **срещу тютюнев трипс:** ЛАНАТ 25 ВП - 80-100 г/дка.

- **срещу калифорнийски трипс:** СИНЕИС 480 СК - 10-25 мл/дка.