

Колорадски бръмбар (*Leptinotarsa decemlineata* Say.)

Автор(и): Растителна защита
Дата: 06.04.2017 Брой: 4/2017



Колорадският бръмбар е от семейство *Chrysomelidae*. Въпреки името си, колорадският бръмбар не произхожда от **Колорадо**, а най-вероятно от централно **Мексико**.

Вреди предимно по културите от сем. Картофови (картофи, патладжан, домати и др.). Развива от 1 до 3 поколения годишно и презимува като възрастно насекоми в почвата на дълбочина 20-30 см. Напролет бръмбарите излизат, когато температурата на почвата на дълбочина 20-25 см достигне 14-15°C. Сухата пролет забавя излизането на бръмбарите от почвата. Женските снасят яйцата си по долната страна на листата, на групи. Вредят както възрастните, така и ларвите, като се хранят с листата на картофите. Колорадският бръмбар е опасен неприятел, който има голяма размножителна способност и ако не се води борба срещу него, е в състояние да унищожи напълно листата, с което добивите се намаляват силно. Най-опасни са повредите, причинени по време на цъфтеж и клубенообразуване.

Разрешени продукти за растителна защита. актара 25 вг – 6 г/дка, алверде 240 ск – 20 мл/дка, биская 240 од – 20 мл/дка, вазтак нов 100 ек – 10 мл/дка, дантоп 50 вг – 4-6 г/дка, калипсо 480 ск – 10 мл/дка, кораген 20 ск – 6 мл/дка, моспилян 20 сп – 6 г/дка, агрия 1050 плюс 50 мл/дка, нексид 015 кс – 30 мл/дка, нуреле д, санба – 80 мл/дка, фюри 10 ек – 10 мл/дка, синеис 480 ск 5 мл/дка, децис 100 ЕК –7,5-12,5 мл/дка, Даскор 440 -75мл/дка.