

Растителна защита при праскова и кайсия в края на юни и началото на юли

Автор(и): проф. Мария Боровинова

Дата: 07.07.2020 Брой: 7/2020



При **прасковата** продължават пръсканията срещу брашнеста мана, сачмянка, кафяво гниене, анарзия, източен плодов червей и листни въшки.

Срещу брашнестата мана се използва един от фунгицидите: Дифкор 250 ЕК – 20 мл/дка, Ембrella – 150мл/дка, Индар 5 ЕВ – 150мл/дка, Карамат 2,5 ЕВ – 300мл/дка, Козавет ДФ – 150г/дка, Кумулус ДФ – 750г/дка, Луна Експирианс – 50мл/дка, Миклофил – 32-60мл/дка, Пасуърд 25 ВГ – 50г/дка, Ритуал – 32-60мл/дка, Серкадис -15мл/дка, Сигнум ВГ – 45г/дка, Систан 20 ЕВ – 15-36мл/дка, Систан Екозом ЕВ – 65-200мл/дка, Скор 250 ЕК – 20-30мл/дка, Солфо 80 ВГ – 750г/дка, Сулгран - 500г/дка, Сяра ВГ – 600г/дка, Тиовит Джет 80 ВГ – 600г/дка, Топаз 100 ЕК – 50мл/дка, Флосул СК– 500мл/дка, Фонтелис СК – 120мл/

дка, Хелиосуфър С – 125-500 мл/дка, Херкулес 120 СК – 15-25 мл/дка. От изброените фунгициди Индар 5 ЕВ – 150мл/дка, Карамат 2,5 ЕВ – 300мл/дка, Луна Експирианс – 50 мл/дка, Пасуърд 25 ВГ – 50г/дка, Сигнум – 45г/дка, Систан 20 ЕВ – 15-36 мл/дка, Систан Екозом ЕВ – 65-200мл/дка, Скор 250 ЕК – 20-30мл/дка, Фонтелис СК – 120мл/дка са ефикасни и срещу кафявото гниене и се използват за едновременна борба срещу двете болести.

Срещу източният плодов червей и анарзията се използва един от инсектицидите: Авант 150 ЕК – 33,3мл/дка, Афърм Опти – 200-225г/дка, Волиам Тарго 063 СК – 75мл/дка, Делегат 250 ВП – 30г/дка, Имидан 50 ВГ – 150г/дка, Кораген 20 СК – 16-30мл/дка, Ламадекс Екстра - 70г/дка, Метеор - 90мл/дка, Суми Алфа 5 ЕК- 0,02%.

При висока плътност на листни въшки се пръска с: При висока плътност на листни въшки се пръска с: Абанто – 60 мл/дка, Аскот ВГ - 40-80г/дка, Дека ЕК/Деша ЕК/Дена ЕК/Полеци/Десижън – 30-50мл/дка, Децис 100 ЕК – 8,75-12,25 мл/дка, Естрела ВГ/Ламша ВГ/Адалам ВГ/Индулам ВГ – 40-80 г/дка, Калипсо 480 СК – 20мл/дка, Ламадекс Екстра -40-60г/дка, Мовенто 100 СК – 0,075-0,1%, Моспилан 20 СГ – 25г/дка, Натюр Брейкър – 75мл/дка, Протеус О-ТЕК -0,05% - 0,06%, Тепеки – 14г/дка.

При **кайсията** се провежда пръскане, което е насочено срещу кафяво гниене, гномониоза, сачмянка, анарзия и източен плодов червей. *Срещу кафявото гниене се използва един от фунгицидите:* Делан 700ВГ – 0,05%, Дифкор 250 ЕК – 20мл/дка, Ембрелиа -150мл/дка, Индар 5 ЕВ -150мл/дка, Карамат 2,5ЕВ – 300мл/дка, Луна Експирианс – 50мл/дка, Пасуърд 25 ВГ – 50г/дка, Сигнум ВГ – 30г/дка, Систан 20 ЕВ – 12,5-30 мл/дка, Хорус 50 ВГ – 40-50г/дка. От посочените фунгициди Делан 700 ВГ – 0,05%, Карамат 2,5 ЕВ – 300 мл/дка и Сигнум ВГ – 30г/дка са ефикасни и срещу гномонията. *Срещу анарзията и източния плодов червей се използва един от инсектицидите посочени при прасковата.*

За да са ефикасни пръсканията срещу болестите и неприятелите при овощните видове те трябва да се провеждат навреме и качествено. Освен това много важно е и да се определя необходимостта от провеждане на дадено пръскане, което е свързано със специални отчитания за определяне плътността на неприятелите и при надвишаване икономическите прагове на вредност да се проведе пръскане.