


Агрометеорологична прогноза за месец април

Автор(и): Растителна защита
Дата: 18.04.2021 Брой: 4/2021



През първото десетдневие на април агрометеорологичните условия ще се определят от температури над климатичните норми. Прогнозираните наднормени топлинни условия ще ускорят вегетационните процеси при зимните житни култури и голяма част от посевите в полските райони ще встъпят масово във фаза вретенене. При рапицата ще се наблюдава образуване на разклонения и начало на фаза бутонизация.

През повечето дни от десетдневие то съществени валежи не се очакват и условията на много места в страната ще позволяват провеждане на

предсеитбените обработки и сеитбата на слънчогледа. През първото десетдневие на април е агротехническият срок за сеитбата на слънчоглед в Северна България.

В края на първото и началото на второто десетдневие се прогнозира понижение на температурите, стабилизиране на времето и съществена промяна в агрометеорологичните условия. През този период се очакват значителни валежи и повишение на почвените влагозапаси и в двуметровия слой. В началото на пролетта в по-голямата част от полските райони почвените влагозапаси при пшеницата в еднометровия слой достигнаха нива над 90% от ППВ. Изключения има на места в източните райони - агростанции Разград, Долни чифлик, Сливен, където нивото на влагозапасите е по-ниско - под 80% от ППВ.

В края на първото и началото на второто десетдневие на април се прогнозира краткотрайно стабилизиране на времето и подходящи условия за провеждане на някои неотложни растителнозащитни пръскания при овощките: във фаза цветен бутон при семковите видове (ябълка, круша) срещу струпясване; следцъфтежно третиране при някои раноцъфтящите костилкови видове срещу ранно кафяво гниене и сачмянка, при черешата и вишната срещу най-опасната гъбна болест – цилиндроспориоза (т.н бяла ръжда) и др.

През второто десетдневие на април развитието на земеделските култури ще се осъществява с по-забавени темпове, при поднормени топлинни условия. В края на десетдневие се прогнозира повишена вероятност за образуване на слани, което трябва да се има предвид при закаляване на зеленчуковия и тютюнев разсад. Прогнозираните минимални температури, на места до минус 2-3°C, при по-продължително задържане ще бъдат критични за цветовете и младите завръзи на овощките.

В началото на третото десетдневие се очаква затопляне и в полските райони почвените температури в десетсантиметровия слой ще достигат подходящи стойности за сеитбата на царевица за зърно.

През третото десетдневие вегетацията на земеделските култури ще се осъществява с умерени темпове при температури близки до

климатичните норми. През този период при зимните житни култури ще протича преход от фаза вретенене към изкласяване и фаза изкласяване. При рапицата ще преобладава фаза цъфтеж.

През април честите валежи ще бъдат предпоставка за повишение на инфекциозния фон от редица гъбни болести по овощките - ранно кафяво гниене, струпяване, сачмянка, къдравост по прасковата и др. По-подходящи условия за провеждане на растително защитни пръскания при овощните култури ще има през повечето дни от първото и през първата половина от третото десетдневие.

Източник НИМХ