

# Опасност от обикновена полевка

Автор(и): Растителна защита  
Дата: 14.04.2022 Брой: 4/2022



В началото на април на места в полските райони от страната паднаха валежи между 10-20 l/m<sup>2</sup> (Карнобат – 10 l/m<sup>2</sup>, Ловеч – 11 l/m<sup>2</sup>, Казанлък – 12 l/m<sup>2</sup>, Кюстендил – 12 l/m<sup>2</sup>, Враца – 14 l/m<sup>2</sup>, София – 17 l/m<sup>2</sup>, Шумен – 18 l/m<sup>2</sup>, Добрич – 20 l/m<sup>2</sup>, Русе – 21 l/m<sup>2</sup>) и подобриха почвеното овлажнение и условията за развитие на земеделските култури.

До средата на месеца вегетационните процеси при зимните житни култури и началните етапи от развитието на засетите до момента пролетници ще се осъществяват при средноденонощни температури около и над нормата. При пшеницата и ечемика ще се наблюдава масово фаза братене. В отделни райони от Дунавската равнина ще се осъществява преход от братене към вретенене, а на места в Южна България (агростанции Любимец и Хасково) ще протича начало на фаза вретенене.

Около 1 млн. 325 хил. дка са площите с есенни култури в Добричка област. От тях почти 1 млн. 200 хил. дка са посежите с пшеница, 56 000 дка с ечемик и почти 72 000 дка с рапица. Въпреки валежите през есента и зимата, има недостатъчно количество почвена влага. Очкват се повече дъждове, за да могат да се развият по-добре, както житните култури, така и новата реколта от царевица и слънчоглед.

Ниските температури през февруари и март попречи на повечето болести в посежите да се развият. Но в североизточните райони на Добричка област се наблюдава обикновена полевка. Установени са до 2 колонии на декар от този неприятел в полетата с предшественик царевица.

---

Проверявайте редовно посежите от обикновена полевка

---

При рапицата ще протича образуване на разклонения. При овощните видове ще се наблюдават фазите разпукване на пъпките, бутонизация и цъфтеж.

При лозата ще протича сокодвигане и набъбване на пъпките. В началото на втората половина от периода на места в полските райони се прогнозира отрицателни минимални температури и риск от евентуални повреди за овощките встъпили във фаза цъфтеж.

В районите от Източна и Централна България, където се прогнозира валежи със стопанско значение, условията ще ограничават възможностите за провеждане на сезонните мероприятия – почвообработки и сеитбата на пролетни култури, предцъфтежни пръскания при трайните насаждения.