

Агрометеорологична прогноза за март

Автор(и): Растителна защита
Дата: 14.03.2023 Брой: 3/2023



Климатичните аномалии през втората половина на февруари, с необичайно високи за сезона максимални температури, надвишили на много места в полските райони 21-22°C (Кнежа - 24°C, Ловеч - 23°C, Плевен - 23°C, Пловдив - 23°C, Чирпан - 23°C), доведоха до активизиране на вегетационните процеси при есенните посеви и до преждевременно развитие на овошките.

През първото десетдневие на март само на места в Южна България – Пловдив, Пазарджик, Сандански, Кърджали и Хасково паднаха валежи със стопанско значение между 20-30 l/m², които доведоха до подобрене на почвените влагозапаси при есенните посеви.

В централните и източните райони температурите бяха над климатичните норми и над биологичния минимум, необходим за вегетацията на зимните житни култури.

През повечето дни от второто десетдневие в полските райони на страната се прогнозира температурите близки до обичайните за периода и условия за протичане на забавена вегетация при зимните житни култури.

Повишение на температурите и активизиране на вегетационните процеси при есенните посеви и трайните насаждения се очаква през първата половина от третото десетдневие. В края на март при пшеницата и ечемика ще преобладава фаза братене.

През месеца при овощните култури ще протичат различни фази - от набъбване и разпукване на плодните пъпки до цветен бутон, цъфтеж и формиране на завръз при раноцъфтящите костилкови видове (бадем, кайсия, праскова).

През март се прогнозира минимални температури от порядъка на минус 5-10°C - стойности критични за цветовете и младите завръзките на овощките.

Очакваните валежи през месеца, около и над нормата, ще увеличават почвените влагозапаси в 100 cm слой. Вследствие поднормените валежи през февруари нивото на влагозапасите в 50 и 100 cm почвен слой при зимните житни култури в крайните южни и югоизточни райони беше необичайно ниско за сезона - на места под 55% от ППВ (агростанциите Сливен, Чирпан).

През март прогнозираното динамично време, с чести валежи, ще възпрепятства провеждането на сезонните агротехнически мероприятия. По-подходящи условия за извършване на предцъфтежни растителнозащитни пръскания при овощките ще има през втората половина от първото десетдневие. През месеца повишеното съдържание на влага в горните почвени слоеве ще ограничава провеждането на предсеитбените обработки на площите, предвидени за засяване с ранни и средноранни пролетни култури. Поради тази причина има вероятност за пропускане на оптималните срокове при сеитбата на слънчоглед в южните райони.

В средата на март започва агротехническият срок (15-20.03) за сеитбата на слънчоглед в Южна България, а в средата на третото десетдневие (25.03–5.04) – в Дунавската равнина.

Къде и кога по райони в страната ще има условия за извършване на растително-защитни мероприятия вижте [ТУК](#)

Източник НИМХ