

Растителнозащитни грижи необходими за предпазване от важни икономически болести по овощните видове през април

Автор(и): Растителна защита

Дата: 10.04.2023 Брой: 4/2023



През април овощните видове в отделните райони на страната са в различни фенофази: „миши уши“, „бял бутон“ или „цъфтеж“.

При **ябълката** във фаза „миши уши“ се извършва първото предцъфтежно пръскане срещу струпясването с един от следните фунгициди: Шампион 50 ВП - 0,3 %; Каптан 80 ВГ - 150-180 г/дка; Мерпан 80 ВГ - 200 г/дка; Купроксат ФЛ – 0,3%; Полирам ДФ – 0,2%, Хорус 50 ВГ - 30-50 г/дка (0,03% - предпазно и 0,05% - лечебно с 100л/дка работен разтвор); Силит 544 СК - 125 мл/дка; Карбикюр - 500 г/дка.



Брашнеста мана по ябълка

Срещу брашнеста мана се препоръчват: Сулгран - 750 г/дка; Топаз 100 ЕК - 20-50 мл/100л работен разтвор; Луна Кеър - 300 г/дка; Белис - 80 г/дка.



Струпясване по ябълка

За едновременна борба срещу брашнеста мана и струпясване са подходящи Флинт Макс 75ВГ - 0,02 %; Фонтелис СК - 75 мл/дка; Микротиол Спешъл Ликуид - 730 мл/дка; Скор 250 ЕК - 0,02-0,03 %; Ревiona - 200 мл/дка; Луна Експириънс - 20-75 мл/дка; Тиовит Джет 80 ВГ - 600 г/дка.

Сортът „Златна превъзходна“ е чувствителен на ръждивост по плодовете, а медните препарати я увеличават, което налага използване на други фунгициди при този сорт. Подходящи са Каптан 80 ВГ и Мерпан 80 ВГ, които успешно може да се използва за предцъфтежните пръскания при Златна превъзходна, а така също и при останалите сортове, които са чувствителни на ръждивост по плодовете.

Сортовете, усойчиви на струпясване - Прима, КООП- 10, Флорина, Либърти, Пионер, Макфрий, Пилот, Топаз, Новамак, Сава, Рубинола, Джонафрий, Джонатан и др., се пръскат само срещу брашнеста мана.

Второто предцъфтежно пръскане при ябълката се провежда във фаза „цветен бутон“. Използват се същите фунгициди, както при първото.

При ябълката през април се провежда и цъфтежното пръскане, което е много важно за предпазване на цветовете от струпясване. През години с чести превалявания и висока атмосферна влажност при чувствителните на струпясване сортове се получават масови заразявания, в резултат на което цветовете окапват и тези повреди много често остават незабелязани и стопаните ги отдават на други причини. Това пръскане е насочено и срещу брашнестата мана и кафявото гниене.

За цъфтежното пръскане се използва един от следните фунгициди: Флинт макс 75 ВП – 0,02% или Хорус 50ВП – 0,03%.



При **крушата** се провежда само едно предцъфтежно пръскане. То е насочено срещу струпясването. Използва се един от фунгицидите: Фунгуран ОН 50ВП – 0,3%, Шампион ВП – 0,3%, Каптан 80 ВГ – 0,2%, Бордо микс 20ВП – 375-500 г/дка. Цъфтежното пръскане при крушата е насочено срещу струпясването и кафявото гниене и се използват фунгицидите, посочени за цъфтежно пръскане на ябълката.



В този период **дюлята** се пръска срещу загиване на завръзките. Първото пръскане срещу тази гъбна болест се провежда във фаза “цветен бутон”, а второто - по време на цъфтежа. За първото пръскане най-добре е да се използва Шампион ВП - 0,3%, а за цъфтежното - Хорус 50ВП – 0,03%.



При всички **костилкови овщни видове** през април обикновено се извършват цъфтежни пръскания за борба срещу кафявото гниене. Ефикасни фунгициди срещу това заболяване са: Хорус 50ВП – 0,045%, Сигнум ВГ – 30г/дка, Делан 700 ВДГ – 0,05%.

Повечето от отглежданите у нас кайсиеви и вишневи сортове са чувствителни на кафяво гниене и при влажна пролет и по-продължителен цъфтеж при тях трябва да се направят две цъфтежни пръскания. Първото - в началото на цъфтежа, а второто - 8-10 дни след първото.

Цъфтежните пръскания да се провеждат сутрин, когато няма летеж на пчели. Използваните фунгициди не са токсични за пчелите, но те трябва да бъдат предпазени от струята при пръскането.



Ягодовите насаждения преди цъфтежа се пръскат с Шампион ВП – 0,3% за опазването им от листни петна (бели и червени).

При **малината**, когато младите издънки достигнат височина 15-20 см, се пръска с Ортива Топ СК срещу брашнеста мана и листни петна, със Скор 250 СК - 0,03-0,04 % и със Сигнум - 150 г/дка срещу дидимела и засъхване на летораслите (кониотириум).