

Агротехнически дейности в овощната градина през април

Автор(и): ас. Кирил Кръстев, Институт по декоративни и лечебни растения – София

Дата: 06.04.2024 *Брой:* 4/2024



През април агрометеорологичните условия ще бъдат с повишена динамика. През първата половина от месеца те ще се определят от неустойчиво време, с чести валежи, които ще подобрят почвените влагозапаси. Вследствие поднормените валежи през март, с изключение на места - Западна България, почвените влагозапаси в 50 cm и 100 cm слой ще бъдат незадоволителни за началото на пролетния вегетационен период.

През първото и началото на второто десетдневие на април прогнозираните температури ще са над нормата за месеца. През повечето дни от втората половина на април развитието на земеделските култури ще се осъществява при температури и валежи близки до климатичните норми.

През втората половина от второто десетдневие се прогнозира вероятност за образуване на слани. Прогнозираните минималните температури, до минус 2°C, при по-продължително задържане ще бъдат критични за цветовете и младите завръзи на овошките.

През месеца прогнозираните чести валежи и вероятността за градушки ще бъдат предпоставка за повишение на инфекциозния фон от редица гъбни болести по овошките - ранно кафяво гниене, струпясване, сачмянка, къдравост по прасковата и други.

След градушка, задължително след цъфтеж, за ограничаване на риска от вторични зарази с патогени е желателно при първа възможност третиране с медсъдържащи фунгициди.


В овощните разсадници

Извършват се почвообработки в семенилицата, маточните насаждения и питомниците. Когато младите издънки достигнат 20-25 см се извършва първото заграбване на ябълковите маточници.

Отгребване на заграбаните през есента присадени подложки на ореха, изрязване на дивата част от около 0,5 см над присадената пъпка.

Внимателно се отстраняват всички филизи, покарали от подложката на засадените в питомниците присадени растения.

Закъсняването с тази практика задържа развитието на летораста от облагородената пъпка. Често конкуренцията на филизите от дивата част е толкова голяма, че пъпката въобще не покарва.



Продължава работата по присаждането на калем на подложките с пропаднали окуланти.

В овощните насаждения

Завършва работата по засаждането на новите овощни насаждения.

Завършва работата по попълването на местата на пропадналите дървчета в младите овощни насаждения.

Всички новозасадени дървчета задължително се поливат с 20-30 дм³ вода в околостъблената чашка.

Приключва работата за формиране на короните на дървчетата в новозасадените и младите овощни насаждения.

Филизи се стъблото на дървчетата в новозасадените градини. На височина 50-60 см над почвената повърхност всички филизи се отстраняват. Извършва се филизене на част от ненужните леторасли в короните на младите дървета.

Пензират се летораслите в младите овощни градини.

Провежда се резитба за отслабване на растежа на силнорастящите ябълкови и крушови дървета.

Препоръчва се за дървета на семенна или силнорастяща вегетативна подложка, формирани като палмета.

Продължава преприсаждането на калем в короните на възрастните дървета.

Провежда се прореждане на завръзките- при ябълки, някои сортове круши и праскови.

В равнинните и по-топлите райони се извършва втора, по-плитка, почвообработка и ако това не е извършено през март, се наторява с азотен тор.



При засушаване се полива. Почвената влага в насажденията през периода на цъфтеж и формиране на завръзките не трябва да спада под 70 % от ППВ.

Пчелните семейства се транспортират от прецъфтелите към насажденията с интензивен цъфтеж.

В ягодовите насаждения



Засаждане на ягоди под полиетиленово фолио

Завършва попълването на празните места в засадените през есента площи (предимно в по-високите райони).

Започва засаждането на съхранения в хладилниците обезвирусен ягодов посадъчен материал върху лехи, застлани с перфориран черен полиетилен.

Растенията се засаждат така, че пъпките да се подават леко над повърхността, без да съществува опасност при започване на вегетацията да попаднат под полиетилена. Преди засаждане корените на разсада се потапят в каша от оборски тор, почва и вода. Ако корените са засъхнали се режат краищата.

Засадените върху черен полиетилен нови площи с ягоди обезателно се поливат чрез дъждуване, за да се осигури прихващане.

Старите насаждения се обработват и ако през март не са били наторени, предварително се извършва наторяване. При необходимост насажденията се напояват.

Извозва се 400-500 кг слама на декар за постилане на почвата под цветоносите и за предпазване на плодовете от замърсяване в насажденията, създадени без черен полиетилен. Преди това насажденията

се напояват. Почвата около растенията се покрива с около 10 см слама. Застилането се извършва към края на масов цъфтеж.

Почвата в култивационните съоръжения се обработва и при необходимост се напоява.

До средата на април от отопляемите оранжерии се прибират последните ягодови плодове.

Започва беритбата на ягодови плодове от слънчевите оранжерии и тунели. По-късно започва и тази на полето.

Оранжерии и тунелите се проветряват редовно. В тях се поддържа необходимата температура за своевременно узряване на плодовете.

В по-топлите месторастения и в насажденията, засадени по-рано се плевят поникналите в отворите плевели.

Плеви се много внимателно, за да не се откъснат не добре вкоренените растения.

В малиновите насаждения

Приключва попълването на празните места и засаждането на нови площи.



Засаждане на малини

Извършват се почвообработки за поддържане на почвата рохкава и чиста от плевели и за заравяне на торовете.

Към края на месеца се подхранва с 10-12 кг амониева селитра или със същото количество от друг азотен тор. При засушаване се полива.

В касисовите насаждения

Полагат се грижи за вкоренилищата – обработка, торене и напояване.

Новите и старите насаждения се обработват. При засушаване се полива.

В насаждения с други култури

Засаждане на нестандартните дафинови растения в питомника за доразвиване.

Извършва се пролетно окулиране на Кавказката хурма с райска ябълка след започване на сокодвижението.

В края на месеца се извършва пикиране на лимоновия разсад на открито на 15-20 см в реда и 1 м между редовете.

Съобразно с необходимостта се провеждат окопаване и поливане на вкоренените резници от смокиня, нар и облепиха.

В зависимост от нуждите на участъка на открито, в който е извършено вкореняване на резници от смокиня, нар и облепиха, се прави окопаване и поливане.

Продължава засаждането на райска ябълка, облепиха, нар и смокиня на постоянно място.

Дафиновите дръвчета се освобождават от зимните обвивки и зимната защита.

В края на месеца се изнасят на постоянно място вкоренените от предната година растения от актинидия и дафиновите фиданки. Извършва се поливане на новозасадените растения.

Пикираните семеначета от актинидия се засаждат в питомник на открито.

Засява се на открито новият посев от семена от дафиново дърво.

Започва окулирането на фисташковите подложки.