

Агротехнически дейности в овощната градина през юни

Автор(и): ас. Кирил Кръстев, Институт по декоративни и лечебни растения – София

Дата: 07.06.2024 *Брой:* 6/2024



През юни агрометеорологичните условия ще се определят от неустойчиво време с валежи, около и над нормата за месеца, които ще поддържат добри и много добри влагозапасите в 50cm и 100cm почвен слой – над 75-80% от ППВ. По-ниски нива на почвените влагозапаси се прогнозира на места в крайните североизточни и югозападни райони (Разград, Русе, Силистра, Сандански), където майските валежи бяха под нормата за месеца.

В началото на юни развитието на земеделските култури ще протича с ускорени темпове, при наднормени топлинни условия.

През повечето дни от второто десетдневие агрометеорологичните условия ще се определят от температури близки до обичайните за периода.

През третото десетдневие на юни се прогнозира наднормени топлинни условия, като се прогнозира максимални температури до 35-36⁰C.

В овощните разсадници

Семенилищата се подхранват с 6-8 амониева селитра или същото количество друг азотен тор на декар и се окопават. При необходимост се напоява. Маточните насаждения се подхранват с 10-15 кг амониева селитра или същото количество друг азотен тор на декар и се загърлят. При необходимост преди загърляне се напояват. В питомниците се провежда филизине, за да се улесни нормалното нарастване на присадниците. Подложките и питомниците се подготвят за окулиране.

В овощните насаждения

Следи се да не се впият превръзките върху клоните на преприсадените овощни дървета и диви форми, като при нужда своевременно се разхлабват. Своевременно трябва да се отстраняват летораслите конкуренти, израснали от майчиното растение.

На новозасадените дръвчета се извършва редовно окопаване. При необходимост се полива.

След втората десетдневка младите овощни насаждения се подхранват с 15-20 кг амониева селитра на декар и се извършва плитка почвообработка. При формиране на палмета се извършва наклоняване на скелетните клони, когато достигнат обща дължина за първи етаж 2 – 2,5 м, за втори – 1,5-2 м и за трети – 1 м. При слаборастящите дървета те се поставят под ъгъл 45-50⁰, а при силно растящите – под 45-45⁰ спрямо хоризонталата. Когато в един етаж има скелетни клони с различна дължина, наклонява се само силният, а слабият се оставя да расте и се наклонява допълнително.



Продължава механичното прореждане на плодовете при праскова.

На площи с осигурено напояване се извършва сеитба на култури за зелено торене.

Започва масовата беритба на череши и вишни.



В ягодовите насаждения

Засажда се последният ягодов разсад, съхранен в хладилник. Продължават грижите по плевенето на младите и новозасадени насаждения. При необходимост се напоява. Продължава беритбата. Не се бере в горещите часове на деня и при възникнала роса. За прясна консумация се берат заедно с плодовата чашка.

В по-топлите месторастения след прибиране на последните плодове сламата се събира веднага и се изнася. Насажденията се подхранват с 8-10 кг амониева селитра или същото количество друг азотен тор на декар и се извършва първа обработка след беритба. При необходимо напояване, то се извършва преди подхранване.



В малиновите насаждения

Извършват се редовни почвообработки. При необходимост се полива. В плододаващите насаждения продължава почистването на редовете от много слаби и излишни издънки. Телената конструкция се поддържа здрава. В някои райони към средата на юни започва беритбата на плодовете от ранните сортове. При започване на зреене пчелните семейства се преместват на други насаждения, но на разстояние не по-малко от 5 км.



В касисовите насаждения

Почвата във вкоренилищата се обработва 2-3 пъти в зависимост от напояването, валежите и наличието на плевели. Извършват се редовни обработки, както на младите, така и на плододаващите насаждения. Към средата на месеца в някои по-топли месторастения започва беритбата на плодовете.

В насажденията с други култури

Продължава присаждането на лимоновите подложки на будна пъпка. Грижите за вкореняване на открито резници от нар, смокиня и облепиха продължават, като питомникът се окопава и полива редовно. Извършват се необходимите обработки срещу плевели. Към края на месеца се окулират на будна пъпка необлагоденените от миналата година подложки с пъпки от райска ябълка. Продължава привързването на лианите на актинидията към спомагателни колчета. Извършва се подхранване с последната 1/3 от годишната азотна норма, определена за актинидията. Почистват се страничните леторасли на основното стъбло на актинидията, за да се стимулира развитието му и цялостното оформяне. Формира се като буквата Т.

