

Агротехнически дейности в овощната градина през октомври

Автор(и): ас. Кирил Кръстев, Институт по декоративни и лечебни растения – София

Дата: 08.10.2024 Брой: 10/2024



През октомври при всички овощни видове активно протича процесът на запасяване с резервни хранителни вещества.

През месеца агрометеорологичните условия ще се определят от температури около и над климатичните норми и валежи близки до нормите за месеца.

През повечето дни от първото десетдневие на октомври съществени валежи не се прогнозиарат. Очакват се валежи в края на първото и началото на второто десетдневие, както и през втората половина на третата декада от месеца.

Условия за работа на полето ще има в средата на второто и през първата половина от третото десетдневие, когато се прогнозира относително сухо време.

В овощните разсадници



Полагат се грижи за запазване кълняемостта на събраните за стратифициране семена от костилковите овощни видове.

Започва подготовката за изваждане на подложките от семенилищата и на дръвчетата от питомник втора година.

Подложките от семенилищата и облагородените дръвчета се изваждат, след като са приключили вегетацията си – втората половина на октомври и ноември.

Растенията не трябва да имат листа. Ако листата не са окапали, за целта се използват 0,1-0,2 % калциев хлорид. Напояването улеснява изваждането.

В овощните насаждения



Продължава беритбата на бадемовите и някои сливови плодове.

Най-късно до средата на месеца трябва да завърши прибирането на есенно-зимните сортове ябълки и круши.

Почвата в междуредията на едногодишните и младите насаждения се обработва дълбоко.

Ако не е извършено предпосадъчно торене с фосфорни и калиеви торове, се внасят по 50-60 кг суперфосфат и 20-22 кг калиев сулфат - или друг фосфорен и калиев тор в същото количество на декар.

Дълбоко се внасят и фосфорните и калиевите торове в плододаващите насаждения.



В ягодовите насаждения

Продължава създаването на нови ягодови насаждения.

Засаждането на разсада трябва да приключи не по-късно от средата на месеца. Разсадът да е пикиран, с малко почва около корените. След засаждане се полива с $0,5 - 1 \text{ дм}^3$ вода на растение.

Извършва се последна обработка на плододаващите насаждения – на дълбочина 10-15 см, като растенията се загърлят леко.

Продължава изваждането и заготовката за съхраняване в хладилник на разсада за пролетно-лятно засаждане.

В малиновите насаждения

Подготвят се площите за създаване на нови малинови насаждения.

Плододаващите насаждения се торят с 2-3 т оборски тор, 20-30 кг суперфосфат и 10-15 кг калиев сулфат - или друг фосфорен и калиев тор в същото количество на декар, след което торовете се заорават дълбоко – 20-25 см.

В касисовите насаждения

При засушаване плододаващите и младите насаждения се напояват.

Извършва се есенно торене с 1-2 т оборски тор, 20-40 кг суперфосфат и 10-15 кг калиев сулфат – или друг фосфорен и калиев тор в същото количество на декар. Почвата в междуредията се обработва на 15-18 см дълбочина, а близо до растенията – на 5-6 см.

В насажденията с други култури

Извършва се есенна оран на 18-20 см дълбочина, което спомага за доброто влагозапасяване на почвата от зимните валежи.

След третата година надземната част на дафиновите насаждения се съкращава на 20-25 см от кореновата шийка. Изрязаните стъбла се пренасят в сухо проветриво помещение за изсушаване на листата.



Започва беритбата на плодовете от райска ябълка, нар, актинидия (киви).

В края на месеца при опасност от студ и при относително сухо време всички растения от дафин (дафинов лист, лавър) се загърлят с плуг.

Продължава прибирането на смокиновите плодове.

Продължават грижите върху заложените за вкореняване зелени резници от актинидия, арония и облепиха и други.

Започва събиране на семена от кукуч за производство на подложки за фисташка.