

# Състоянието на есенниците за третата десетдневка на март в района на Централна Южна България е добро

*Автор(и):* доц. д-р Златина Ур, ИРГР, Садово; доц. д-р Евгений Димитров, ИРГР, Садово

*Дата:* 23.03.2025 *Брой:* 3/2025



След краткотрайното застудяване в края на второто десетдневие на март, с отрицателни минимални температури и критични стойности, под минус 3°C, за встъпилите във фаза цъфтеж овошки, в края на март агрометеорологичните условия ще претърпят промяна. През повечето дни от периода те ще се определят от неустойчиво време, с наднормени температури, които ще ускорят вегетацията на земеделските култури.



При овощните култури, без опасност от критични минимални температури, ще протичат фазите: разпукване на пъпките, бутонизация и цъфтеж при костилковите видове.



Снимка© доц. Златина УР и доц. Евгений Димитров

През третото десетдневие на март при пшеницата ще протича масово фаза братене.

„Състоянието на есенниците за третата десетдневка на март в района на Централна Южна България е добро”, споделят доц. д-р Златина Ур и доц. д-р Евгений Димитров от ИРГР Садово. Тази година, за разлика от последните 5-6 година, падна сняг, който освен влагозапасяване, предпази и растенията от студовете (отрицателните температури). Поради коригираният сеитбен период – края на октомври до началото на ноември, пшеницата поникна през ноември и както и през последните години тя не изпадна в зимен покой. Растенията понесоха добре застудяването през втората половина на февруари и не се наблюдава жълтеене на посевите (пригор по растенията). В следствие на пролетните температури от 5 до 17 март 2025 в района на Централна Южна България вегетацията на обикновената зимна пшеницата се ускори. В момента посевите са във фаза братене – усилено брати. Досега в района няма икономически важни валежи, но се надяваме прогнозираните количества валежи да бъдат реализирани и да спомогнат за формиране на нормални растения.

След обстояни огледи на специалист фитопатолог, не се констатирани нападения от икономически важни болести. Очакваните валежи могат да провокират развитието и разпространението на брашнеста мана. Извършено е подхранване на посевите с азотен тор с част от торовата норма и третирането с листни торове. Престои пръскане с инсектицид за борба с обикновена житна пиявица (*Lema melanopa*).

---

## Обикновената житна пиявица застрашава сериозно добивите от пшеница

---

Очакваните превалявания през периода ще подобрят съдържанието на влага в горния почвен слой. Незадоволителни за началото на пролетта са почвените влагозапаси в 50 и 100 cm слой при зимните житни култури на много места в страната, с изключение на част от източните райони. Необичайно ниско, под 65% от ППВ, е нивото на влагозапасите на места в Северозападна България, агростанция Николаево.

Прогнозираните чести превалявания през следващия период ще възпрепятстват провеждането на растителнозащитните пръскания при овощните култури срещу причинителите на редица болести: струпясване, ранно кафяво гниене, къдравост по прасковата. По-подходящи условия за провеждане на почвообработки и сеитба на средноранни пролетни култури ще има в началото на периода. Следващият период съвпада с агротехническият срок за сеитбата на слънчоглед в Южна България.