

През втората половина на ноември ще има условия за провеждане на сезонни агротехнически мероприятия и засаждане на ОВОШКИ

Автор(и): Растителна защита
Дата: 09.11.2025 Брой: 11/2025



Агromетeорoлoгичните условия през ноември ще се определят температури близки и над климатичните норми и валежи около и под нормата за месеца.

До края на първото и началото на второто десетдневие на ноември агromетeорoлoгичните условия ще се определят от неустойчиво време. Падналите валежи в края на изтеклия седемдневен период и

очакваните през следващия - допълнително ще забавят, след агротехническите срокове, сеитбата на пшеницата. До момента са засети около половината от предвидените площи.

Валежите през октомври, надвишили два - три пъти климатичните норми (София, Плевен, Ловеч, В.Търново, Разград, Русе, Пазарджик, Ст. Загора, Бургас), поддържаха високо съдържането на влага в горните почвени слоеве, което забави провеждането на предсеитбените обработки и сеитбата на зимните житни култури. Поради тази обективна причина в по-голямата част от страната, с изключение на места в Дунавската равнина и в източните райони, са пропуснати агротехническите срокове, през октомври, за сеитбата на пшеницата. Значителна част от площите, предвидени за зимни житни култури, ще бъдат засети през ноември. Голяма е вероятността ноемврийските посеви до края на есенната си вегетация да не успеят да встъпят във фаза братене, подходящата фаза за зимуване.

През повечето дни от ноември се прогнозира наднормени средноденонощни температури, които ще поддържат активни вегетационните процеси при есенните посеви. В края на месеца при пшеницата и ечемика, в зависимост от сеитбените дати, ще се наблюдават различни фази. При засетите през ноември посеви ще протича поникване и листообразуване (1-2-3 лист). При малка част от посевите с пшеница на места в Дунавската равнина и в източните райони (Добрич, Генерал Тошево, Тервел, Провадия, Карнобат), които бяха засети в началото на есента, ще се наблюдава начало на фаза братене.



*Най-опасният неприятел по житните култури е обикновения житен бегач (*Zabrus tenebrioides*), който напада пшеница, ечемик, царевича, овес и редица житни треви.*

В началните фази от вегетацията на пшеницата и ечемика посевите трябва да се обследват за вредители. Повреди нанасят обикновената полевка, ларвите на житния бегач и житните мухи, и при плътност над ПИВ е необходима навременна растителна защита.



През ноември по-подходящи условия за засаждане на овошки и за извършване на фитосанитарни дейности при овощните култури ще се създават през второто десетдневие. При семковите овощни видове (ябълка, круша), нападнати от болестта струпасване, се препоръчва третиране с 5% разтвор от карбамид. При костилковите видове е желателно да се извърши пръскане с 2% бордолезов разтвор срещу причинителите на сачмянка, ранно кафяво гниене и къдравост по прасковата.