

# Брашнести мани по овощните видове с причинители от род *Podosphaera*

*Автор(и):* гл. експерт д-р Анелия Райкова, Институт по земеделие – Кюстендил, ССА

*Дата:* 16.04.2026 *Брой:* 4/2026



## Абстракт

Брашнестите мани по овощните култури с представители на род *Podosphaera*, представляват широко разпространен и икономически значим фитопатологичен проблем в овощарството. Засягат както семкови, така и костилкови овощни видове и се характеризират с висока адаптивност към различни агроекологични условия. Управлението на тези болести се основава на интегриран подход, включващ съчетаване на агротехнически мерки, използване на устойчиви и слабо чувствителни сортове, целесъобразни методи за борба, както и употребата на прогнозни модели за оценка на

инфекциозния риск. Като икономически значими представители се откроява брашнестата мана по ябълка, с причинител *Podosphaera leucotricha* (Ellis and Everh.) E. S. Salmon и при прасковата, с причинител *Podosphaera pannosa* (Wallroth) de Bary, което налага извеждането на екологосъобразна борба срещу причинителите.



*Брашнеста мана при ябълка*

Род *Podosphaera* обхваща гъбни причинители на брашнести мани, които са установени при редица овощни култури, както и ягода, касис и лешник [1,12,15,18]. Икономически щети насяват основно при ябълката с основен причинител *Podosphaera leucotricha* (Ellis et Everhart) E.S. Salmon с конидиен стадий *Oidium farinosum* Cooke [1,9,20] и прасковата-*Podosphaera pannosa* (7,15). Съгласно данните на EPPO Global Database, причинителите на брашнести мани при овощни принадлежат към род *Podosphaera*, сем. *Erysiphaceae*, разред *Erysiphales*, клас *Ascomycetes*. И двата вида са облигатни биотрофни аскомицентни патогена, специализирани към тъкани с живи гостоприемници [11,12]. Причинителят на брашнеста мана *P. leucotricha* има полициклично развитие и презимува като мицел, който се закрепва към растителния орган чрез апресории (специални разклонения), а чрез хаустории извършва храненето от растителната клетка. Върху мицелът в заразените листни и смесени пъпки се образуват конидионосци с 6-9 едноклетъчни спори, подредени

във верижка. Плодните тела на патогена са клейстотеции, но у нас рядко се образуват [3]. Клейстотециите са тъмни със сферична форма и с два вида придатъци- прости и дихотомно разклонени. В плодните тела се образува по един аксус, с едноклетъчни аскоспори [4]. През пролетта се развива системна форма на болестта, а през вегетационния период разпространението на болестта се осъществява чрез конидиоспори. Патогенът се развива в широк температурен диапазон (4- 30° C) и за покълване на конидиите не е необходима капка вода, поради потенциалът им да покълнат при въздушна влажност над 34 %. Автори съобщават, че мицелът спира развитието си при температури над 33°C [3].



*Брашнеста мана при ябълка*

Симптоми по ябълката причинени от *P. leucotricha* се наблюдават по листни и смесени пъпки заразени през предшестващата година (системна форма на болестта). От заразените листни пъпки се формират слаби развити летораста покрити с плътен бял налеп който се състои от мицела и спорите на гъбата. От заразените смесени пъпки се формират листа и цветове, изцяло покрити с брашнест налеп, предизвикващ пожълтяване и преждевременно окапване. Заразените цветните пъпки са дребни, деформирани и не образуват завръзи, покафеняват и окапват. При инфекция през същия вегетационен период (локалната форма

на болестта) по листата се наблюдава сивобелезникав налеп, който преустановява развитието си в мястото на повреда и се наблюдава деформация на листната петура. Брашнести петна се наблюдават и по листни дръжки, покрити с мицелът, който достига и обхваща здрави пъпки. Гъбата има потенциала да колонизира и плодовете на силно чувствителни сортове с признаци на ръждива мрежичка, която обхваща плода в различна форма и дълбочина. Описани от редица автори са силно чувствителни сортове като „*Golden Delicious*”, „*Jonathan*” [14,19,4], чийто добив може да бъде значително редуциран, ако не бъде проведена борба срещу болестта. Данни от дългосрочни полски наблюдения в селекционната програма Дрезден-Пилниц (Dresden-Pillnitz) показват, че сортовете ябълка „*Remo*”, „*Regia*”, „*Rewena*” и „*Rebella*” се характеризират със висока степен на устойчивост към брашнестата мана [10]. В по-скорошно полско проучване при сходни условия на естествен инфекциозен фон е установено, че сортовете „*Delicious*”, „*Demir*”, „*Dayton*” и „*Burgundy*” не проявяват симптоми на заболяването и демонстрират висока степен на полска устойчивост в рамките на два последователни вегетационни сезона [8]. С умерена чувствителност са установени сортовете „*Gala*”, „*Honeycrisp*”, „*Mutsu*” [4,23]. Дългогодишни проучвания в Институт по земеделие- Кюстендил показват, че борбата срещу патогена може да се улесни с приложението на по-устойчиви сортове, намаляващи инфекциозния фон. Изследвания проведени в Института установяват, различна степен на чувствителност на ябълкови сортове, откроявайки слабочувствителни „*Prima*” и „*Erwin Baur*” [1,20], умерено чувствителни „*Mutsu*” [21], и силно чувствителен „*Moir*a” [1,9].



### *Брашнеста мана по праскова*

Симптомите на брашнеста мана по праскова, причинявана от *Podosphaera pannosa* (Wallroth) de Bary, с конидиен стадий *Oidium leucoconium* Desmazières са сходни с тези при ябълката. Заболяването засяга зелените органи на растенията, включително листа, млади леторасты, и плодове. Патогенът се проявява в две форми - системно (дифузно) и локално, като системната е от особено значение в ранните фази на вегетацията. През пролетта, при разпукуване на заразените пъпки, се развиват леторасты с характерен брашнест налеп, което води до забавяне на растежа и развитието [4]. При благоприятни условия болестта може да обхване и младите плодове, в резултат на което се наблюдават деформации и трайно влошаване на търговските качества на продукцията. Инфекциозния процес при *Podosphaera pannosa* е типичен за облигатни биотрофи, като патогенът прониква в растителните тъкани чрез директно преминаване през кутикулата и формиране на хаустории в епидермалните клетки [17].

### **Стратегия за борба**

#### **Агротехнически мерки**

Основните агротехнически мероприятия срещу причинителите на брашнеста мана включват:

- Избор на подходящ сорт, които да са устойчиви или слабо чувствителни сортове към патогена, което значително ще намали инфекциозния фон и необходимостта от фунгицидни третирания [1,14].
- Изборът на подходящо място и разстояния на засаждане и добре оформената корона, които подобряват аерацията и ограничават формирането на благоприятен микроклимат за развитието на патогена [1,2].
- Балансираното торене допринася за оптимален вегетативен растеж и ограничава чувствителността към брашнеста мана, докато прекомерното азотно подхранване, повишава чувствителността [2,13].
- Резитби с цел отстраняване на инфектираните летораста и клонки, редуциране количеството на първичната зараза и е ключова мярка за ограничаване на ранните инфекции през пролетта [2,23].

## **Химичен и биологичен подход за борба**

Прилагане на фунгицидни пръскания, одобрени срещу болестта имат ограничаващ ефект, като стратегиите за контрол следва да бъдат насочени към ефективно ограничаване на първичните и вторични инфекции. Най-широко използваната група активни вещества срещу *P. leucotricha* са инхибиторите на биосинтеза на ергостерол (Demethylation inhibitor (DMI), FRAC група 3), сред които миклобутанил, пенконазол, тетраконазол, дифеноконазол и флутриафол [23,25] и стробилурини (Quinone outside inhibitors (QoI), FRAC група 11) [25]. Ротация на активни вещества следва да бъде съблюдавано, за да се предотврати резистентност към DMI и QoI фунгициди. Важно за фунгицидните третирания да бъдат извършвани съобразно одобренията за страната продукти за растителна защита срещу болестта.

Наред с химичния контрол, през последните години нараства интересът към биологичните средства за ограничаване на причинителя на брашнеста мана при ябълката. Сред най-добре проучените биологични агенти срещу брашнест мана са представители на род *Bacillus*, които показват ефективност срещу различни видове *Podosphaera*, включително при овощни култури, главно чрез повишаване на съдържанието на хлорофил и

подобряване на фотосинтетична дейност, допринасящо за по-добро физиологично състояние на растенията и повишена устойчивост към инфекция от *P. leucotricha* [16]. Има налични изследвания и за ефективността на дрожди към ограничаване на степента на нападение от *P. leucotricha* с 37.4 % [5,6].

Не на последно място е и използването на прогнозни модели за развитие на болестите като важен инструмент за оптимизиране на контрола на брашнестата мана по ябълката. Модели като RIMpro използват метеорологични данни, фенологичното развитие на културата и биологични параметри на патогена за прогнозиране на периодите с повишен риск от първични и вторични инфекции, което позволява по-прецизно и навременно прилагане на растителнозащитни мероприятия. Изследвания в Европа и в България показват, че използването на подобни модели допринася за намаляване на броя на третиранията, без компромис с ефикасността на контрола, и подпомага управлението на фунгицидната устойчивост чрез ограничаване на ненужните приложения [13,20,22]. Въпреки че, повечето прогнозни модели са разработени първоначално за струпяването по ябълката, редица от тях, включително RIMpro, успешно интегрират и модули за брашнеста мана, което ги прави ценен елемент от съвременната интегрирана растителна защита (IPM) срещу *P. leucotricha* в условията на променящ се климат.

Брашнестите мани остават един от ключовите фитопатогени предизвикателства с икономическо значение, особено в условията на интензивно производство и променящи се климатични условия. Комбинирането на устойчиви или слабо чувствителни сортове с интегриран подход за управление на болестта, включващ агротехнически, растителнозащитни мерки, допълнени от прогностични модели дава възможност за дългосрочно ефективна и перспективна стратегия за контрол [16,21,23,24].

---

### **Литературни източници**

1. Боровинова, М. (2007). *Икономически важни гъбни болести по ябълката и черешата и техният контрол при интегрирано плодпроизводство* Институт по земеделие-Кюстендил.
2. Джувинов, В., Гандев, С., Арнаудов, В., Ранкова, З., Начева, Л., & Добревска, Г. (2016). *Ябълка*. Биофрут БГ- ЕООД.

3. Накова, М., Наков, Б., Каров, С., & Нешев, Г. (2015). *Специална фитопатология*. Издателство ИМН- Пловдив
4. Станчева, Й. (2021). *Болести по трайните култури* ИНФИНТИ БУКС.
5. Alaphilippe, A., Elad, Y., David, D. R., Derridj, S., & Gessler, C. (2008). Effects of a biocontrol agent of apple powdery mildew (*Podosphaera leucotricha*) on the host plant and on non-target organisms: an insect pest (*Cydia pomonella*) and a pathogen (*Venturia inaequalis*). *Biocontrol Science and Technology*, 18(2), 121-138. <https://doi.org/10.1080/09583150701818964>
6. Alaphilippe, A., Elad, Y., Derridj, S., & Gessler, C. (2007). Effect of introduced epiphytic yeast on an insect pest (*Cydia pomonella* L.), on apple pathogens (*Venturia inaequalis* and *Podosphaera leucotricha*) and on the phylloplane chemical composition. *IBOC Bull*, 30, 259-263.
7. Ashraf, M. A., Khan, A. S., Shireen, F., Nawaz, S., Ayyub, S., Mohibullah, S., Asim, M., Riaz, T., Khalid, B., & Azam, M. (2025). Peach diseases in a changing climate: Pathogens, resistance, and sustainable solutions. *Microbial Pathogenesis*, 108110.
8. Awan, S. I., Thapa, R., Svara, A., Feulner, H., Streb, N., & Khan, A. (2023). Evaluation of Malus Germplasm Identifies Genetic Sources of Powdery Mildew and Frogeye Leaf Spot Resistance for Apple Breeding. *Phytopathology®*, 113(7), 1289-1300. <https://doi.org/10.1094/phyto-11-22-0417-r>
9. Borisova, A., Borovinova, M., & Kamenova, I. (2014). Major diseases of apple trees in Kyustendil region of Bulgaria. *Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences*, 1(Özel Sayı-1), 695-700.
10. Fischer, M., & Fischer, C. (2004). Genetic resources as basis for new resistant apple cultivars. *Journal of Fruit and Ornamental Plant Research*, 12(Spec. ed. 2).
11. Gañán-Betancur, L., Peever, T. L., Evans, K., & Amiri, A. (2021). High Genetic Diversity in Predominantly Clonal Populations of the Powdery Mildew Fungus *Podosphaera leucotricha* from U.S. Apple Orchards. *Applied and Environmental Microbiology*, 87(15), e00469-00421. <https://doi.org/doi:10.1128/AEM.00469-21>
12. Glawe, D. A. (2008). The powdery mildews: a review of the world's most familiar (yet poorly known) plant pathogens. *Annu. Rev. Phytopathol.*, 46(1), 27-51.
13. Holb, I. (2014). Apple powdery mildew caused by *Podosphaera leucotricha*: some aspects of disease management.
14. Holb, I. J. (2009). Apple powdery mildew caused by *Podosphaera leucotricha*: some important features of biology and epidemiology. *International Journal of Horticultural Science*, 15(1-2), 45-51. <https://ojs.lib.unideb.hu/IJHS/article/view/1096>

15. Leus, L., Dewitte, A., Van Huylbroeck, J., Vanhoutte, N., Van Bockstaele, E., & Höfte, M. (2006). *Podosphaera pannosa* (syn. *Sphaerotheca pannosa*) on *Rosa* and *Prunus* spp.: Characterization of Pathotypes by Differential Plant Reactions and ITS Sequences. *Journal of Phytopathology*, 154(1), 23-28. <https://doi-org.salford.idm.oclc.org/10.1111/j.1439-0434.2005.01053.x>
16. Liu, B., Xu, Y., Ji, S., Zhang, P., Zhang, H., Han, J., Fan, H., Wang, J., Qi, J., Ma, Y., & Liu, Z. (2023). Isolation and identification of *Bacillus* and abilities of 3 functional strains to control powdery mildew and promote seedling growth of *Malus sieversii*. *European Journal of Plant Pathology*, 167(1), 11-24. <https://doi.org/10.1007/s10658-023-02680-5>
17. Marimon de María, N. (2020). Towards an integrated control of peach powdery mildew (*Podosphaera pannosa*) through the application of molecular tools in epidemiological and genetic resistance studies [PhD, Universitat de Lleida].
18. Marimon, N., Eduardo, I., Martínez-Minaya, J., Vicent, A., & Luque, J. (2020). A Decision Support System Based on Degree-Days to Initiate Fungicide Spray Programs for Peach Powdery Mildew in Catalonia, Spain. *Plant Disease*, 104(9), 2418-2425. <https://doi.org/10.1094/pdis-10-19-2130-re>
19. Morariu, P. A., Sestras, A. F., Andrean, A. F., Borsai, O., Bunea, C. I., Militaru, M., Dan, C., & Sestras, R. E. (2025). Apple Cultivar Responses to Fungal Diseases and Insect Pests Under Variable Orchard Conditions: A Multisite Study. *Crops*, 5(3), 30. <https://www.mdpi.com/2673-7655/5/3/30>
20. Petrova, V., & Borovinova, M. (2014). Control of Powdery Mildew (*Podosphaera leucotricha*) and European Red Mite (*Panonychus ulmi*) At Scab Resistant Apple Cultivars. *Bulgarian Journal of Crop Science*, 51(4-5), 7-11. <https://agriacad.eu/ojs/index.php/bjcs/article/view/3687>
21. Petrova, V., Dimitrova, S., & Georgieva, V. (2025). Biological manifestations of three apple cultivars and degree of attack by apple scab and powdery mildew. *Bulgarian Journal of Crop Science*, 62(6), 103-110. <https://doi.org/10.61308/OBJ5429>
22. Rossi, V., Salinari, F., Poni, S., Caffi, T., & Bettati, T. (2014). Addressing the implementation problem in agricultural decision support systems: the example of vite. net®. *Computers and Electronics in Agriculture*, 100, 88-99.
23. Strickland, D. A., Hodge, K. T., & Cox, K. D. (2021). An Examination of Apple Powdery Mildew and the Biology of *Podosphaera leucotricha* from Past to Present. *Plant Health Progress*, 22(4), 421-432. <https://doi.org/10.1094/php-03-21-0064-rv>
24. Strickland, D. A., Spsychalla, J. P., van Zoeren, J. E., Basedow, M. R., Donahue, D. J., & Cox, K. D. (2023). Assessment of Fungicide Resistance via Molecular Assay in Populations of

- Podosphaera leucotricha*, Causal Agent of Apple Powdery Mildew, in New York. *Plant Disease*, 107(9), 2606-2612. <https://doi.org/10.1094/pdis-12-22-2820-sr>
25. Vielba-Fernández, A., Polonio, Á., Ruiz-Jiménez, L., de Vicente, A., Pérez-García, A., & Fernández-Ortuño, D. (2020). Fungicide Resistance in Powdery Mildew Fungi. *Microorganisms*, 8(9), 1431. <https://www.mdpi.com/2076-2607/8/9/1431>