

В края на май и началото на юни – неустойчиво време с висок риск от градушки и условия за развитие на болести при земеделските култури

Автор(и): Растителна защита
Дата: 02.06.2026 *Брой:* 6/2026



През следващия седемдневен период (29.05.-04.06.2026 г.) агрометеорологичните условия ще се определят от неустойчиво време. Развитието на земеделските култури ще се осъществява при температури близки до климатичната норма и при наличие на оптимални почвени влагозапаси, вследствие падналите значителни валежи през май и надвишили в по-голямата част от полските райони месечната норма.

През периода при зимните житни култури ще протича наливане на зърното и фаза млечна зрелост, предимно при посевите в източните и южните райони - Сандански, Търговище, Силистра, Провадия и Карнобат.



Житните дървеници (*Eurygaster integriceps* Put.) повреждат стъблата на житните растения, зърното, в резултат на което се понижава количеството и се влошава качеството му. В повредените зърна се съдържа по-малко количество глютен, полученото брашно е с влошени хлебопекарни качества, поради което хлябът е сбит. <https://www.plant-protection.com/bg/article/2277?lang=bg>

В края на май и началото на юни повреди по пшеницата нанасят ларвите на житната дървеница, което изисква обследване на посевите и при плътност на вредителя над прага на икономическа вредност (2бр. ларви/м²) е необходимо при първа възможност да се извърши третиране.

ВИКСЕРАН: Естествена сила и устойчив добив при царевицата

През периода при царевицата и слънчогледа ще протича листообразуване. При засетите в агротехнически срок посеви със слънчоглед в крайните южни райони ще се наблюдава и

начало на фаза формиране на съцветие.



Брашнеста мана Oidium tuckeri. Високата атмосферна влажност и трайното затопляне на времето през месеца са предпоставки за развитието на болестта. <https://www.plant-protection.com/article/1802?lang=bg>

При лозата ще се осъществява цъфтеж на ресите - критична фаза за заразяване с оидиум.



Симптоми на фузариоза по класовете на пшеницата. <https://www.plant-protection.com/article/1780?lang=bg>

Честите валежи през периода ще създават условия за развитие на болести: фузариоза по пшеницата, късно кафяво гниене по плодовете на зреещите череша, сиво гниене по ягодите. Съществува висок риск за градушки и полягане на пшеничните посеви.