

# В лозето и овощната градина през април

Автор(и): Растителна защита  
Дата: 18.04.2016 Брой: 4/2016



## Лозя

Метеорологичните условия през втората половина на април обикновено са много подходящи за нападение от болести по лозата. Най-критичните за заразяване от мана и оидиум и за нападение от акари и молци са периодите преди и по време на цъфтежа.

### Основни вредители за периода

Брашнеста мана (оидиум)

Мана по лозата

Жълт лозов акар

Ериофидни акари

Шарен гроздов молец

Лозова щитовка

## Овощни култури

През месеца активно се формират и нарастват плодовете на овощните видове. Високите температури и честите превалявания налагат интензивна растителна защита за опазване от болести. Необходими редовни прегледи и обследвания за появата и развитието на болестите и неприятелите. При семковите видове борбата е насочена срещу основните болести и неприятели - струпяване, брашнеста мана, огнен пригор, листни въшки, листогризеци гъсеници, плодови червеи и др. При костилковите овощни видове се следи за нападения от ранно кафяво гниене, сачмянка, брашнеста мана, бяла ръжда, гномония, плодови червеи, листни въшки и др. Динамиката и числеността на плодовите червеи се установяват чрез поставяне на феромонови уловки в овощните насаждения, както и на жълти лепливи плоскости тип „Ребел” за установяване началото на летеж на черешовата муха.

### Основни вредители за периода

Струпяване по ябълка

Брашнеста мана по ябълка

Калифорнийска щитоносна въшка

Бяла американска пеперуда

При ябълката третиранията срещу икономически най-важните болести – струпяване и брашнеста мана може да се изведат комбинирано.

**Регистрираните фунгициди за борба са посочени в Списък на разрешените за употреба ПРЗ/2016 г., който издава списание "Растителна защита".**