

В зеленчуковата градина през май и юни

Автор(и): Растителна защита
Дата: 22.05.2016 Брой: 5/2016



Практики през периода: Полагат се грижи за разсадите за късните домати, средноранното главестото и цветното зеле, праса – поливане, подхранване, плевене. Прилагат се необходимите агротехнически практики за разсадените вече ранни полски и за поникналите от директна сеитба зеленчукови култури. Периодът е характерен с чести превалявания, а от там и по-високата влажност на въздуха и почвата. Формират се т.нар. критични периоди за поява и развитие на **картофена мана** и **видовете мани** по зеле и лук, обусловени от комплекс агрометеорологични условия: пълна облачност, 2-3 дни тихи и продължителни валежи, по-ниска температура, относителна въздушна влажност над 80%. Ако валежите са краткотрайни, благоприятстват развитието на **черни листни петна**, а ако са съпроводени със силен вятър – на **бактериози** (петносвания и пригори).

Защита на растенията:

Болести по домати и краставиците

Домати: по разсадите се наблюдават **черни листни петна** (алтернариоза) и **картофена мана**. В култивационните съоръжения освен тях се появяват **брашнеста мана, сиво гниене (ботритис)**, а по полските – и **бактерийни петносвания и пригори**, но без **брашнеста мана**. Борбата при полското производство да се провежда по сигнал от регионалните служби.

Краставици: в култивационните съоръжения се срещат **брашнеста и кубинска мана, ъгловати петна** (бактериоза).

Неприятелите по домати и краставиците в култивационните съоръжения са с постоянен състав, но за паяжинообразуващите акари и трипсовете има по-благоприятни условия за силна вредоносна дейност – високи температури и ниска относителна влажност. Затова трябва да се оросява често и пътеките да се поддържат влажни. Стъклата да се засенчват с подходящи смеси. Като се има предвид, че културите са в усилено плододаване, трябва да се прилагат пестициди с кратък карантинен срок.

На открито по домати, пипер, патладжан през този период вредят **листни въшки, трипсове** (пренасят вируса на бронзовостта), **сиви червеи, колорадски бръмбар**, а обикновено от началото на юни започва летежът на **цикадката *Hyalesthes obsoletus***, която пренася фитоплазмата на **столбура**. Борбата е успешна, когато се третира в най-подходящия момент, сигнализиран от регионалните служби за растителна защита.

Зелето се напада от **мана**, срещу която се прилагат препоръчаните при картофената мана средства. От неприятелите вредят **листни въшки, земни бълхи, дървеници, тютюнев трипс, зелева муха, гъсеници на зелева нощенка, зелев молец, градинска нощенка**.

Лук – вниманието да се насочи към **маната, тютюневия трипс, миниращата празова муха**. Срещу тях се прилагат посочените по-горе при другите култури средства.

Не забравяйте добавянето на прилепител към пестицидните разтвори, прилагани при зелените и луковите култури.