

# Болестите отстъпват, неприятелите настъпват

Автор(и): Растителна защита  
Дата: 21.06.2016 Брой: 6/2016



*За опазване на зеленчуковата и плодовата реколта е необходимо да продължи борбата срещу вредителите и през втората половина на юни и през юли.*

Поради по-високите температури на въздуха и на почвата през този период е задължително да се пръска сутрин рано или вечер. Валежите са малко и се увеличава дефицитът на въздушна влага. Плодовете наедряват интензивно, а нарастването на летораслите завършва. В резултат на високите въздушни температури се наблюдават повреди по плодовете, наречени „слънчев пригор“.

Много важно е да се събират окапалите плодове и да се изнасят извън овощните градини, за да се намали плътността на неприятелите и степента на зараза от болести.

Засушаването не е много благоприятно за развитието на бактериалните и гъбни болести по културите е по-ограничено, но е “добре дошло” за размножаването на неприятелите - плодови червеи, акари, миниращи и гроздови молци, бяла американска пеперуда, листните въшки.

## Зеленчуци

### Основни вредители за периода

- Картофена мана по дамат
- Кафяви листни петна /Алтернария/ по дамат
- Брашнеста мана по дамат
- Бели листни петна по дамат
- Бактерийно струпяване по дамат
- Кубинска мана по тиквовите
- Брашнеста мана по тиквовите
- Листни въшки по зеленчуковите култури
- Голи охлюви

## Картофи

### Основни вредители за периода

- Мана по картофите
- Кафяви листни петна /Алтернария/ по картофите
- Колорадски бръмбар
- Листни въшки

## Овощни култури

### Основни вредители за периода

- Ябълков плод червей
- Сликов плод червей
- Източен плод червей

- Калифорнийска щитоносна въшка
- Бяла американска папаруда
- Червен овощен акар
- Кръгломиниращ молец
- Обикновена крушова листна бълха
- Листни въшки по овцните видове
- Струпяване по ябълка и круша
- Брашнеста мана по ябълка
- Брашнеста мана по праскова

## Лоза

### Основни вредители за периода

- Брашнеста мана /оидиум/
- Мана
- Сиво гниене
- Жълт лозов акар
- Шарен гроздов молец