

Брашнеста мана по някои зеленчуци

Автор(и): проф. д-р Стойка Машева, ИЗК "Марица" Пловдив

Дата: 22.08.2016 Брой: 8/2016



Брашнеста мана по зеленчукови видове от сем.Сенникоцветни - напада всички надземни части на културите от сем. Сенникоцветни – моркови, магданоз, целина, копър. Особено опасна е тя за цветоносите в семепроизводните посеви. При силно нападение съществува реална опасност семената да не узреят. Два патогена причиняват брашнеста мана по видовете от това семейство - *Erysiphe umbelliferatum* и *Erysiphe heraclei*.

Брашнеста мана по листни зеленчуци – спанак /причинители *Oidiopsis haplophylli*, *Leveillula spp.*, *Uncinula spp.*/ марули и салати /причинител *Golvinomyces cichoracearum*

Брашнеста мана по бамя/ причинител *Erysiphe cichoracearum*/

Б

орба:

- Отглеждане на устойчиви сортове;
- Сеитба на проветриви места;

- Оптимална гъстота на посевите;
- Балансирано торене;
- Контрол на условията на околната среда чрез редовно проветряване, монтиране на вентилационни съоръжения;
- Системен мониторинг на посева за ранно установяване на нападението (преглеждане на листата и от двете страни);
- Третиране с ПРЗ – най-добре превантивни, редуване на продукти с различен механизъм на действие срещу придобиване на резистентност;
- Подходящи ПРЗ – с активни вещества - сяра, миклобутанил, стробилурины, екстракт от Неет масло, фитофунгициди и растителни масла.