

Нов вредител по пипера и растението годжи бери

Автор(и): Растителна защита
Дата: 25.08.2016 Брой: 8/2016



*Българска агенция по безопасност на храните предприе мерки срещу нов за страната вредител, който напада предимно растенията годжи бери и пипер. Видът *Aceria kuko* - Godji berry gall mite Галообразуващ ериофиден акар по годжи бери е установен за първи път в района на град Пловдив, село Малък чардак. Всички площи с установена зараза са поставени под карантина и се изпълняват мерки за ограничаване на разпространението на вредителя.*

В Централната лаборатория по карантината на растенията в София фитосанитарните инспектори на БАБХ са установили наличието на нападение с галообразуващ ериофиден акар в районите на Пловдив, Видин, Враца, Варна, Благоевград и Перник. Засегнати са предимно насаждения и разсадници с годжи бери и пипер. Предприетите мерки срещу ограничаване и унищожаване на заразата се извършват от Българската агенция по безопасност на храните. Площите със заразени растения са поставени под

карантина. Забранява се и брането на резници от насаждения, които са болни. Извършва се резитба и унищожаване на нападнатите растителни части и химично третиране, предписано от специалистите в Агенцията. Видът *Aceria kuko* - Godji berry gall mite - Галообразуващ ериофиден акар по годжи бери - е установен за първи път в района на град Пловдив, село Малък чардак, съобщиха инспекторите.

Галообразуващ ериофиден акар (*Aceria kuko*)

Галообразуващият ериофиден акар по годжи бери е разпространен в Китай, Северна Корея, Тайван. През 2011 година е забелязан в Словения и Германия, а през 2012 година в Гърция и Великобритания. 2015 година се появява и в Унгария и Кипър. Вероятно е пренесен у нас със заразен посадъчен материал от съседни страни. Напада предимно растенията от вида *Lycium barbatum* (Годжи бери), растение от сем. Solanaceae/Картофиви/. Вредителят е установяван и върху *Capsicum annuum*L. (пипер) и *Solanum nigrum*L. (черно куче грозде). Повредите които нанасят акарите са по листата на нападнатите растения като образуват гали, с формата на мънисто и размер от 3 до 5 см в диаметър, в тях се намират акарите, които се хранят със сока от растенията.

Още по темата:

Ериофидните акари