

Картофена мана

Автор(и): Растителна защита
Дата: 13.02.2017 Брой: 2/2017



Причинителят на картофената мана по домотите (**гъбата *Phytophthora infestans***) напада всички надземни, части на домотовите растения. Затова трябва да се обследват оранжерии за поява на признаци от болестта. Първите петна да се търсят по периферията на най-долните листа. Наблюдават се неправилни до закръглени воднисти петна, които по-късно покафеняват. При висока влажност от долната страна на петната се появява пръстен с белезникав спорообразуващ налеп.

Стратегия за контрол на вредителя

Култивационните съоръжения да се проветряват редовно. Да не се допуска оросяване на растенията и задържане на капки вода по тях. В отопляемите оранжерии това може да се постигне чрез повишаване на температурата.

Преди появата на първите признаци на болестта, да се извършват профилактични третираня.

Разрешени продукти за растителна защита

акробат р - 0,25 % (250 г/дка), акробат плюс вг - 200 г/дка, валбон - 180-200 г/дка, верита вг - 0,15 %, винкер вг - 200 г/дка, икуейшън про - 0,04 % (40 г/дка), кариал стар - 60 мл/ дка, консенто ск - 200 мл/дка, корсейт 60 вг - 20-30 г/дка, корсейт м дф - 0,25 %, куадрис 25 ск - 0,075 %, купертин м - 400 г/дка, лието - 40-45 г/дка, манкоцеб 80 вп - 0,25 %, манфил 75 вг - 210 г/дка, меден оксихлорид 50 вп - 0,25 %, мелоди компакт 49 вг - 185 г/дка, пенкоцеб 80 вп - 200 г/дка, пенкоцеб 75 вг - 210 г/дка, пергадо мед 27 вг - 500 г/дка, полирам дф - 0,2 %, проксанил - 250 мл/дка, реvus 250 ск - 0,05 % (50 г/дка), ридомил голд мц 68 вг - 0,25 %, ридомил голд р вг - 500 г/дка, санкоцеб 80 вп - 200 г/дка, синстар - 70-80 мл/дка, фортуна глоуб - 200 г/ дка, фунгуран он 50 вп - 0,15 %, шампион вп/макк 50 вп/шамп вп - 0,15 %, каптан 80 ВГ - 150-190 г/дка.