

Листна плесен по доматиите

Автор(и): Растителна защита
Дата: 20.02.2017 Брой: 2/2017



*Листната плесен е болест, която напада доматиите, отглеждани в оранжерии или парници. Когато обаче времето е много влажно, тя се наблюдава и в лехите на открито, и в градините. Причинител - *Cladosporium fulvum*.*

Първите видими признаци на болестта да се търсят по листата от долните етажи на растенията. От горната страна на листата се наблюдават бледи, разлети петна, от долната се формира светъл, а по-късно - кафяв налет. Върху един лист могат да се образуват много петна. Нападнатите тъкани некротират, а при силно нападение поразените листа падат.

Стратегии за контрол на вредителя:

- В оранжерии да се осигури добро проветряване, влажност на въздуха под 70 % и температура 18-22°C.

- Балансирано минерално торене;
- Благоприятен воден и въздушен режим;
- Устойчиви сортове;
- Обеззаразяване на почвата след приключване на вегетацията;
- При поява на болестта да се третира с някой от разрешените фунгициди.

Разрешени продукти за растителна защита:

СИНСТАР - 70-80 мл/дка и ЦИДЕЛИ ТОП -100 мл/дка, СИНГУН- 100-150 г/дка (разрешението му изтича на 09.06.2017).