

Растителнозащитни грижи през юни при лоза

Автор(и): гл.експерт Татяна Величкова, Дирекция "Оценка на риска по хранителната верига", ЦОРХВ

Дата: 13.06.2017 Брой: 6/2017



В този период лозите се намират от фенофаза „масов цъфтеж“ до фенофаза „грахово зърно“- „затваряне на грозда“

Основни вредители за периода

Мана по лозата *Plasmopara viticola*

Брашнеста мана *Oidium tuckeri*

Сиво гниене *Botrytis cinerea*

Шарен гроздов молец *Lobesia botrana*

Лозова щитовка *Pulvinaria vitis*

Жълт лозов акар *Schizotetranychus viticola*

Сиво гниене

Във фенофаза „масов цъфтеж“ по цветчетата и цветните дръжки се образуват кафяви петна, които се покриват със спороношението на патогена. Тези симптоми са известни като ранно сиво гниене.

Стратегия за контрол на вредителя: При дъждовно и топло време, непосредствено след цъфтежа, при поява на ягоридата и при затваряне на грозда се пръска с един от регистрираните продукти за растителна защита.

Разрешени продукти за растителна защита: арвак 50 вг - 100-150 г/дка; геокс вг - 100 г/дка; дриза вг - 100-150 г/дка; кабрио топ – 0,2%; кантус - 100 г/дка ; мевалон - 160-400 мл/ дка; пролектус 50 вг - 120 г/дка; ребют вг - 100-150 г/дка; сабуесо - 100-150 г/дка; синпро - 150 мл/дка ; суич 62.5 вг - 0,08 %; тирам 80 вг – 0,4%; топ плюс 70 вг – 0,1%; топсин м 70 вг – 0,1%; фолдър 80 вг - 150 г/дка; фолоу 80 вг/ фрилър 80 вг/ флоует 80 вг - 187,5 г/дка; фолпан 80 вг - 0,1 % + ардент 50 ск - 0,015 %; шавит ф 72 вг – 0,2%.

Шарен гроздов молец

През юни летят пеперудите от второ поколение на неприятеля. Те снасят яйцата си върху зърната с големината на грахово зърно (ягорида). Гъсениците повреждат ягоридата, като нагризват и изгризват вътрешността на зърната заедно със семената. Повредените зърна оплитат слабо с копирени нишки. Една гъсеница поврежда от 7- 24 зърна.

Стратегия за контрол на вредителя: Да се третира при **ПИБ:** за десертни сортове 6-7 гъсеници на 100 ягорида , а за винени сортове 11-12 гъсеници на 100 ягорида.

Разрешени продукти за растителна защита: афикар 100 ек – 40 мл/дка; даскор 440 - 50 мл/дка; децис 100 ек - 12,5-17,5 мл/дка; дипел 2 х - 0,1 %; дукат 25 ек - 70 мл/дка; ефциметрин 10 ек/цайпер 10 - 40 мл/дка; карате зеон 5 кс – 0,02%; кораген 20 ск - 18 мл/дка; лузиндо 40 вг - 0,025 кг/дка; магеос - 10 гр.дка; малтоато - 40-60 мл/дка; нексид 015 кс - 0,03 %; нуреле д /хлорсирин 550ек /санмба - 60 мл/дка; ранер 240 ск - 0,04 %; рапакс - 75-100 мл/дка; релдан 40 ек - 0,12 %; синеис 480 ск - 4-18 мл./дка; суми алфа 5 ек/сумицидин 5 ек - 0,025 %; форея 48 б - 0,15 %; фюри 10 ек - 0,0125 %; циклон 10 ек - 40 мл/дка; циперфор 100 ек - 40 мл/дка ; цитрин макс /циперкил 500 ек /циперт 500 ек /поли 500 ек - 6 мл./дка; шерпа 100 ев /афикар 100 /циперфор 100 ев /циклон 100 ев - 25 мл/дка; шерпа 100 ек - 40 мл/дка.