

Растителнозащитни грижи през август при лоза

Автор(и): гл.експерт Татяна Величкова, Дирекция "Оценка на риска по хранителната верига", ЦОРХВ

Дата: 28.08.2017 Брой: 8/2017



В този период лозите се намират от фенофаза „прошарване“ до „узряване на зърната“.

Основни вредители за периода

Мана по лозата *Plasmopara viticola*

Брашнеста мана *Oidium tuckeri*

Сиво гниене *Botrytis cinerea*

Шарен гроздов молец *Lobesia botrana***Жълт лозов акар *Schizotetranychus viticola*****Шарен гроздов молец**

През август, до втората половина на месец септември летежът на пеперудите от трето поколение на неприятеля продължава. Гъсениците от това поколение повреждат зазряващите и вече узрелите зърна на гроздето, като ги оплитат с копринени нишки. Вследствие на повредите се създават условия за проникване на причинителя на сивото гниене.

Стратегия за контрол на вредителя:

Да се третира при **ПИБ**: за десертни сортове 7-8 гъсеници на 100 ягорици , а за винени сортове 10-12 гъсеници на 100 ягорици.

Разрешени продукти за растителна защита:

афикар 100 ек – 40 мл./дка; даскор 440 - 50 мл./дка; децис 100 ек - 12,5-17,5 мл./дка; дипел 2 х - 0,1 %; дукат 25 ек - 70 мл./дка; ефциметрин 10 ек/цайпер 10 - 40 мл./дка; карате зеон 5 кс – 0,02%; кораген 20 ск - 18 мл./дка; лузиндо 40 вг - 0,025 кг/дка; магеос - 10 гр.дка; малтоато - 40-60 мл./дка; нексид 015 кс - 0,03 %; нуреле д /хлорсирин 550ек /санмба - 60 мл./дка; ранер 240 ск - 0,04 %; рапакс - 75-100 мл/дка; релдан 40 ек - 0,12 %; синеис 480 ск - 4-18 мл./дка; суми алфа 5 ек/сумицидин 5 ек - 0,025 %; форея 48 б - 0,15 %; фюри 10 ек - 0,0125 %; циклон 10 ек - 40 мл./дка; циперфор 100 ек - 40 мл./дка ; цитрин макс / циперкил 500 ек /циперт 500 ек /поли 500 ек - 6 мл./дка; шерпа 100 ев /афикар 100 /циперфор 100 ев / циклон 100 ев - 25 мл./дка; шерпа 100 ек - 40 мл./дка.

Жълт лозов акар

През месец август се наблюдава застъпване на популациите от няколко поколения. При силно нападение листните петури на лозите се деформират, стават груби и при смачкване хрущят. Температури над 32-35°C са летални за популациите на акара. През първата половина на септември, женските преминават под старата кора на лозовите растения, за да презимуват.

Стратегия за контрол на вредителя:

Третира се срещу възрастни и ларви при достигнат **ПИБ** - 9-10 *бр./лист* - до края на месец август.

Разрешени продукти за растителна защита:

аполо 50 ск - 30-40 мл./дка; енвидор 240 ск - 40 мл./дка; масай вп - 25 г/дка; нисоран 5 ек - 0,05 %; ортус 5 ск /данитрон 5 ск - 0,05 %; санмайт 20 вп - 0,05 %.