

# Черешова муха (*Rhagoletis cerasi* L.)

Автор(и): Растителна защита  
Дата: 22.05.2018 Брой: 5/2018



Това е икономически най-важният неприятел по черешата. Летежът на мухите започва при температура на почвата около 10°C. Излитането съвпада със зазряването на най-ранните сортове череши. Неприятелят снася яйцата си в започналите да узряват плодове. Вреда нанася ларвата, която се храни с месестата част на плода. Повредените плодове потъмняват, загиват и хлътват в мястото на повредата. Червивите плодове са негодни за консумация.

**Стратегия за контрол на вредителя:**

За установяване на най-подходящите моменти за борба срещу черешовата муха могат да се използват комбинирани уловки, които се поставят преди заразяването на ранните сортове череша. Борбата срещу черешовата муха са води срещу възрастното насекомо преди яйцеснасянето, за което е много важно да се установи началото на летежа на мухата, което става с помощта на уловки.

Химичният контролът с черешовата муха се провежда срещу възрастните преди да снесат яйцата си, ориентировъчно 10-12 дни след началото на летеж.

## **Разрешените продукти за растителна защита:**

вазтак нов 100 ек – 0,015%; децис 2,5 ек – 0,03%; децис 100 ек - 10–17,5 мл/дка; ефория 045 зк - 150 мл/дка; калипсо 480 ск – 0,02%; карате експрес вг / нинджа /форца - 60-100 г/дка ; карате зеон 5 кс - 15 мл/дка; натуралис - 100-200 мл/дка; фюри 10 ек – 0,0125%.