

През август все още не е отминала опасността от болестите и неприятелите по ОВОЩНИТЕ ДЪРВЕТА

Автор(и): проф. д.с.н Иванка Лечева; проф. Мария Боровинова

Дата: 23.08.2018 *Брой:* 8/2018



При ябълковите сортове, които са чувствителни на брашнеста мана, борбата срещу тази болест също продължава. За едновременен контрол и срещу струпяването най-добре е да се използват фунгициди, които са ефикасни и срещу двата патогена. Сортовете, устойчиви на струпяване – Прима, КООП-10, Фролина, Либърти, Джонафрий, Джонатан, Пионер, Макфрий, Пилот, Топаз, Новамак, Сава, Рубинола др., се пръскат само срещу брашнеста мана.

През август се третира и срещу горчивите ядки /петна/ по ябълката. Повредите от тази неинфекциозна болест се наблюдават през периода на узряването им, а по-късно и по време на съхранението.

Засегнатите плодове са осеяни с многобройни тъмни хлътнали петна, които най-често са концентрирани в долната част на плода. По-късно те стават по-силно оцветени, като при червено обагрените плодове придобиват тъмночервен цвят, а при жълто- и зелено оцветените стават светлозелени до зелени.

Понякога засегнатите ябълки нямат външни симптоми и не се различават от здравите, но при разрязване се виждат кафяви ядки, разпръснати измежду здравето плодовото месо. Горчивите ядки представляват тъмнокафява гъбеста тъкан с горчив вкус. За предотвратяване на това заболяване се третира два-три пъти с CaCl_2 - 0,6 %. Първото пръскане се провежда около един месец преди беритбата, а следващите в интервал от 10-12 дни. Препоръчва се и листния тор Вуксал калций – 300-600 мл/дка. С него се провеждат минимум 6 пръскания, като първото се извършва след оформянето на завръзките, а следващите - в интервал от 12-15 дни. Необходимо е да се избягва воден стрес на дърветата, беритбата да се провежда в най-благоприятните срокове за всеки сорт.

През първата половина на август продължава борбата срещу второто поколение на ябълковия плодов червей.

Все още има растителнозащитни грижи при крушата, черешата, прасковата и ягодите.

При биологично производство не се разрешава употреба на синтетични пестициди. За борба срещу гъбните болести се използват мед-съдържащи и сяра-съдържащи фунгициди. За контрол на ябълковия и източния плодов червей са одобрени Мадекс топ и Мадекс твин – 10 мл/дка, както и диспенсъри - РАК 3+4 за ябълков плодов червей и РАК 5+6 и ФЕРОКОН АМ за източен плодов червей. Натуралис ОД е включен в списъка за контрол обикновената крушова листна бълха.

За борба срещу ябълковия пъстър миниращ молец ефикасен биоинсектицид е Ним азал Т/С – 300 мл/дка.

Синеис 480СК е разрешен за употреба при: ягода срещу трипси, кайсия, праскова и нектарина срещу прасковен клонков молец, круша срещу крушова листна бълха и ябълка срещу ябълков плодов червей и ябълков пъстър миниращ молец.

Информация за препаратите за растителна защита, които са одобрени срещу различните болести и неприятели през август ще намерите в брой 7/2018 на сп. "Растителна защита".