

В овощната градина през септември – химичните третириания намаляват

Автор(и): проф. д.с.н Иванка Лечева; проф. Мария Боровинова

Дата: 18.09.2018 Брой: 9/2018



Температурите през септември се понижават и обикновено максималните не надвишават 25°C. Листният апарат на дърветата продължава да фотосинтезира активно и осигурява изхранването на плодовете/при есенните и зимни сортове/, диференцирането на плодните пъпки и отлагането на резервни хранителни вещества. През този месец при повечето от овощните видове не се налага да се провеждат третириания, но макар и по-малко все още има нужда от тях.

При **ябълката** се пръска срещу късните инфекции от струпясване и причинители на гниене на плодовете по време на съхранение от гъби от родовете *Monilinia*, *Penicillium*, *Botritis*, *Alternaria*, *Botryosphaeria*, и др. Продължава вридата и от ябълковия плодов червей.

Ябълковите сортове, чийто плодове ще се прибират през втората половина на септември, да се пръскат с инсектициди с къс карантинен срок.

При къснозреещите **крушови сортове** трябва да продължи борбата срещу плодните червеи/ябълков, източен и крушов/ и причинителите на гниене на плодовете. Използват се инсектицидите и фунгицидите, посочени при ябълката.

Плодовете на сортовете **дюли**, които се отглеждат у нас, са силно чувствителни на късно кафяво гниене, сиво гниене и меко гниене, които са особено вредоносни при чести превалявания по време на зреене на плодовете, а по-късно и при съхраняването им. Това налага да се пръска срещу тези патогени. За предпазване на плодовете от червясване от ябълков и източен плодов червей към фунгицидния разтвор се добавя и инсектицид.

За препаратите, които са необходими за пръскане в този период информация ще намерите в брой 8/9 2018 г. на списание „Растителна защита“.