

Geeignete Bedingungen für die Durchführung der vorbereitenden Bodenbearbeitung und die Aussaat von Sonnenblumen werden Ende März gegeben sein.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 24.03.2019 Брой: 3/2019



In der kommenden Periode werden die agrometeorologischen Bedingungen durch Temperaturen über den klimatischen Normen für die dritte Märzdekade bestimmt.

Ungewöhnlich für den Frühlingsbeginn wird sich die Entwicklung der Winterkulturen in Teilen der Feldregionen des Landes unter unzureichenden Bodenfeuchtereserven in der 50-cm-Schicht vollziehen – eine Folge der unterdurchschnittlichen Niederschläge am Winterende, der überdurchschnittlichen März-Temperaturen und der

anhaltend aktiven Vegetation der Kulturen. Ende der zweiten Märzdekade wurden die geringsten Feuchtereserven in der 50-cm-Schicht, gemessen in Weizen, stellenweise in den südlichen und südöstlichen Regionen des Landes verzeichnet, unter 65 % der Feldkapazität. Die besten Feuchtereserven, über 85–90 % der Feldkapazität, werden für die Winterkulturen in den nordwestlichen Teilen der Donauebene gemeldet.

Gegen Ende der Periode ist ein Temperaturrückgang und eine Änderung der agrometeorologischen Bedingungen zu erwarten. Die prognostizierten Werte der Minimaltemperaturen, stellenweise bis minus 2°C, bergen ein Risiko für die Blüten und den Fruchtansatz der in ihrer Entwicklung fortgeschrittenen Steinobstarten, insbesondere wenn die niedrigen Temperaturen länger anhalten.

Weitere Niederschläge werden erwartet und die Bedingungen für die Keimung der ausgesäten Frühjahrskulturen werden sich verbessern.

Beim Weizen wird das Bestockungsstadium flächendeckend zu beobachten sein, und stellenweise in den nordöstlichen Regionen (Tsarev Brod, Dolni Chiflik) – der Beginn des Schossen. Beim Raps wird die Bildung von Verzweigungen im Gange sein.

An den meisten Tagen der Periode werden die Bedingungen für die Durchführung der Bodenbearbeitung vor der Aussaat und die Aussaat von Sonnenblumen geeignet sein. Während der Periode läuft der optimale Zeitrahmen für die Sonnenblumenaussaat in Südbulgarien ab. Mitte der dritten Märzdekade beginnt das agrotechnische Fenster für die Sonnenblumenaussaat in der Donauebene (25.03.–05.04.).

Quelle: NIMH