

Krankheiten und Schädlinge von Erdbeere und Himbeere im Mai

Автор(и): проф. д.с.н Иванка Лечева; проф. Мария Боровинова

Дата: 24.05.2019 Брой: 5/2019



Bei **Himbeeren** richten sich die Spritzungen gegen Didymella, Anthraknose, Triebbasis-Trockenfäule/Leptosphaeriosis/, Grauschimmel, Himbeer-Käfer (*Agrilus*), Himbeergallmücke, Himbeergallmilbe und Himbeerkäfer. Gegen die Krankheiten wird eines der folgenden Fungizide eingesetzt: Dithane M45 – 0,2%, Kocide 200 WG – 0,12%, Funguran OH 50 WP – 0,15% und Cuprozet Gold M – 0,15%. Zur Bekämpfung von Himbeerschädlingen ist kein Insektizid in der Liste der zugelassenen Pflanzenschutzmittel enthalten. Laut Tsoleva, 2002, sind die Insektizide Bi-58 – 0,1%, Karate Zeon – 0,02%, Vaztak New – 0,015% und Decis 2,5 EC – 0,04% gegen die genannten Schädlinge wirksam. Die Autorin empfiehlt, die ersten beiden Insektizide bei der ersten Spritzung einzusetzen, die anderen beiden bei der zweiten Spritzung. Bei Auftreten von Milben wird

NeemAzal TS in einer Konzentration von 0,3–0,5% angewendet. Dieses Bioprodukt wirkt auch auf Blattläuse und Zikaden.

Erdbeerplantagen werden im Mai gegen Grauschimmel, Echten Mehltau, Erdbeerblütenstecher und Erdbeerstängelstecher gespritzt. Gegen Grauschimmel wird eines der folgenden Fungizide verwendet: Switch 62,5 WG – 100 g/da, Signum WG – 75 g/da, Synpro SC – 150 ml/da, Captan – 150 g/da, Thiram 80 WG – 0,3%, Shavit F WDG – 0,2%, Prolectus 50 WG – 80–120 g/da. Zum Schutz der Erdbeere vor Echtem Mehltau wird mit einem der zugelassenen Fungizide gespritzt: Systhane 20 EW – 30 ml/da, Systhane Ecozon EW – 55–130 ml/da, Cidely Top DC – 10 ml/da, Ortiva Top SC – 100 ml/da, Shavit F 72 WDG – 0,2%, Thiovit Jet 80 WG – 500 g/da. Von den aufgeführten Fungiziden ist Cidely Top DC auch gegen Weißfleckenkrankheit wirksam.

Gegen Rüsselkäfer wird Avant 150 EC – 25 ml/da oder Calypso 480 SC – 20 ml/da eingesetzt.