

Agrometeorologische Prognose für Ende Oktober

Автор(и): Растителна защита
Дата: 25.10.2019 *Брой:* 10/2019



An den meisten Tagen der kommenden Periode werden die agrometeorologischen Bedingungen von trockenem und für die Jahreszeit warmem Wetter bestimmt sein, was zu einer Vertiefung des Feuchtigkeitsdefizits in den Herbstkulturen führen wird. In den meisten Landesteilen, insbesondere an Orten in Nordwestbulgarien – den agrometeorologischen Stationen Kneja und Băzovec, in der Sofioter Ebene – der agrometeorologischen Station Lozen, und in der Oberthrakischen Tiefebene – den agrometeorologischen Stationen Plovdiv, Pazardzhik und Sliven, sind die Bodenfeuchtereserven in der 50-cm-Schicht knapp, unter 45–50 % der Feldkapazität, und an einigen Orten völlig erschöpft. In diesen Gebieten wird das Feuchtigkeitsdefizit die Entwicklung von Weizen, Gerste und Winterraps einschränken und verzögern.

Die prognostizierten Niederschläge am Ende der Periode werden von keiner wirtschaftlichen Bedeutung sein. In einigen Gebieten der Donauebene besteht ein reales Risiko der Austrocknung eines Teils der gekeimten Wintergetreidekulturen.

Vor dem Hintergrund der verstärkten Dürre gibt es Ausnahmen in den äußersten südlichen und südöstlichen Regionen, wo in den ersten zehn Tagen des Oktober höhere Niederschlagsmengen fielen – über 25–30 l/m² – Sandanski, Kardzhali, Haskovo, Elhovo und Burgas. Diese verbesserten die Bedingungen für die Aussaat und für den Fortschritt der Anfangsstadien der Vegetation der ausgesäten Herbstkulturen.

Während der nächsten Periode wird in den Regionen, in denen Feuchtigkeit kein limitierender Faktor ist, bei Weizen und Gerste das Auflaufen und der Beginn der Blattbildung zu beobachten sein. Ein Teil der Kulturen in den südlichen Regionen, hauptsächlich die Anfang Oktober ausgesäten, wird in das Dreiblattstadium eintreten – die agrometeorologische Station Karnobat.

In der letzten Oktoberwoche werden die Bedingungen geeignet sein, um die Flächen von späten Reihenkulturen zu räumen und den Ertrag von herbst-winterlichen Obstbaumsorten zu ernten. Die Periode ist geeignet für die Pflanzung von Himbeeren und Schwarzen Johannisbeeren.

Quelle NIMH