

Agrometeorologische Prognose für Anfang November

Автор(и): Растителна защита
Дата: 05.11.2019 Брой: 11/2019



Am Ende der vergangenen Periode fiel im Nordosten und Nordwesten Bulgariens Niederschlag zwischen 10 und 20 l/m²: in Novo Selo – 10 l/m², Widin – 16 l/m², Russe – 11 l/m², Rasgrad – 10 l/m² und Silistra – 20 l/m², was die Bedingungen für die Anfangsstadien der Wintergetreidekulturen vorübergehend verbesserte. In den übrigen Regionen des Landes waren die Niederschläge unbedeutend, und dort schreitet die Entwicklung der landwirtschaftlichen Kulturen unter einem Defizit an Bodenfeuchtigkeit nur mühsam voran.

Während der nächsten Siebentageperiode werden die agrometeorologischen Bedingungen von warmer und überwiegend trockener Witterung bestimmt. Die Entwicklung der landwirtschaftlichen Kulturen, bei denen die Bodenfeuchtigkeit kein limitierender Faktor ist, wird bei Temperaturen um und über der klimatischen Norm in

normalem Tempo voranschreiten. Für Weizen wird an den agrometeorologischen Stationen Pawlikeni und Chaskowo die Auflaufphase beobachtet, an den Stationen Nowatschene und Silistra – der Beginn der Blattbildung, und an den Stationen Karnobat, Glawiniza und Jambol – das dritte Blatt.

Zu Beginn des Novembers werden die Bedingungen günstig sein für die Bodenbearbeitung auf für Frühjahrskulturen vorgesehenen Feldern, für die Pflanzung junger Obstbäume und für das Spritzen von Obstbäumen mit einer 5%igen Harnstofflösung nach dem massenhaften Laubfall. Die Behandlungen sollten bei ruhiger Witterung und Windgeschwindigkeiten von bis zu 2–3 m/s durchgeführt werden.

Quelle: NIMH