

# Instabiles und kühles Wetter für die Jahreszeit

*Автор(и):* Растителна защита  
*Дата:* 31.05.2020 *Брой:* 5/2020



Ende Mai und Anfang Juni werden die agrometeorologischen Bedingungen von unbeständigem und für die Jahreszeit kühlem Wetter geprägt sein. In vielen Landesteilen sind signifikante Niederschläge vorhergesagt, die die Feuchtigkeitsreserven in den oberen Bodenschichten und die Vegetationsbedingungen für Sommerkulturen verbessern. Die erwarteten Niederschläge Ende Mai und Anfang Juni werden sich für einen Teil der Weizenbestände in einigen Gebieten Ostbulgariens (Provadia, Shabla, D. Chiflik, Karnobat) als zu spät erweisen, wo die Stadien des Ährenschiebens, der Blüte, der Befruchtung und der Kornbildung unter einem sich verschärfenden Bodenfeuchtedefizit stattfanden. In einigen östlichen Regionen werden die vorzeitig vergilbten Weizenbestände mit schlecht ausgebildeten Ähren nicht geerntet werden.

In der folgenden Periode werden die Wintergetreidekulturen in den Hochlagen im Stadium der Kornfüllung sein. In den Niederungsregionen wird Weizen im Milchreifestadium sein. Gerste wird im Milchreifestadium sein und gegen Ende der Periode in die Wachsreife übergehen. Raps wird im Reifestadium sein. Während der Periode werden Mais und Sonnenblume im Blattbildungsstadium sein. Bei Sonnenblumen, die innerhalb des agrotechnischen Zeitrahmens gesät wurden, wird die Bildung des Blütenstandes zu beobachten sein.

Das vorhergesagte kühle Wetter mit häufigen Niederschlägen während der Periode wird Bedingungen für einen Anstieg des Infektionsdrucks durch einige pilzliche Pathogene schaffen – Falscher Mehltau in Weinbergen und Gemüsekulturen, Späte Braunfäule bei späten Kirscharten, Schorf bei Kernobstarten usw. Anfang Juni sollte die Bekämpfung eines der gefährlichsten Schädlinge in Obstanlagen – des Apfelwicklers – nicht unterschätzt werden. Bedingungen für die Durchführung von Pflanzenschutzspritzungen werden in der Mitte der ersten Junidekade gegeben sein.

*Quelle: NIMH*