

Anfang September herrschen geeignete Bedingungen für die Ernte der im Frühjahr ausgesäten Kulturen und für das Einbringen der Obst- und Gemüseernte.

*Автор(и): Растителна защита
Дата: 07.09.2020 Брой: 9/2020*



Ende August waren die agrometeorologischen Bedingungen durch überdurchschnittliche Temperaturen und fehlende Niederschläge gekennzeichnet, was sich negativ auf die Endstadien der Entwicklung von Spätfrühlingskulturen auswirkte und die ordnungsgemäße Durchführung der Bodenbearbeitung vor der Aussaat behinderte.

In der folgenden Periode werden die agrometeorologischen Bedingungen durch Temperaturen nahe den klimatologischen Normen bestimmt. Zu Beginn der Periode sind stellenweise in Nordostbulgarien wirtschaftlich bedeutende Niederschläge vorhergesagt. Während der Periode wird sich die Sonnenblume überwiegend im Stadium der technischen Reife befinden. Bei späten Maishybriden treten die Milch- und Wachsreifestadien auf. Der optimale Zeitraum für die Aussaat von Winterrapsflächen ist im Gange. In vielen Regionen wird Bodentrockenheit die agrotechnischen Maßnahmen und die Aussaat von Winterraps behindern. Dies wird spätere Aussaaten erforderlich machen, wobei der mögliche Aussaatzeitraum bis Ende des Monats verlängert werden kann. In Apfelanlagen wird die Schadaktivität der zweiten Generation des Apfelwicklers überwacht und bei Bedarf werden Behandlungen gegen den Schädling durchgeführt. Bei Weizen und Gerste für die Herbstaussaat wird eine Beizung gegen samenbürtige Krankheiten (Steinbrand, Flugbrand, Septoria-Blattfleckenkrankheit und Fusarium-Krankheiten) durchgeführt.

Die Bedingungen werden geeignet sein für die Ernte von Frühjahrskulturen, die die technische Reife erreicht haben, für die Durchführung von Pflanzenschutzmaßnahmen in Dauerkulturen und für die Ernte von Obst- und Gemüseproduktion.

Quelle: NIMH