

Kritische Perioden für Krankheiten und Schädlinge

Автор(и): Растителна защита
Дата: 19.02.2021 Брой: 2/2021



Sonnenblume

Auflauf – 4.–5. Blatt – Rüsselkäfer (Grauer Maisrüsselkäfer *Tanymecus dilaticolis*, Schwarzer Rübenrüsselkäfer *Psallidium maxilosum*)

Auflauf – Knospenbildung – Falscher Mehltau *Plasmopara halstedii*

Keimung – Auflauf – Blüte – Grauschimmel *Botrytis cinerea*

Keimblätter – Blühbeginn – Rost *Puccinia helianthi*

5.–6. Blatt – Knospenbildung – Graue Blattflecken *Diaporthe helianthi*, Braune Blattflecken *Alternaria sp.*, Schwarzfäule *Macrophomina phaseolina*, Verticillium-Welke *Verticillium sp.*

Blüte – Gelbreife – Sklerotinia *Sclerotinia sclerotiorum*

Blüte – Kornfüllung – Trockenfäule des Kopfes *Rhizopus sp.*

Mais

Vor der Saat – während der Saat – 6.–7. Blatt – Drahtwürmer aus der Familie *Elateridae*

Keimung – Samen- und Keimlingsfäule *Fusarium sp.*, *Aspergillus sp.*, *Nigrospora oryzae*

Auflauf – 5.–7. Blatt – Rüsselkäfer (Grauer Maisrüsselkäfer *Tanymecus dilaticolis* und Grauer Rübenrüsselkäfer *Tanymecus palliatus*), Erdraupen aus der Familie *Noctuidae*

Ab Beginn der Vegetation – Blattläuse *Aphis evonymi*, *Rhopalosiphum maidis*,

1.–9. Blatt – *Viruskrankheiten* (Maize Dwarf Mosaic *Maize dwarf mosaic virus* und Wheat Streak Mosaic *Wheat streak mosaic virus*)

5.–6. Blatt – Blüte – Maisbeulenbrand *Ustilago zeae*

6.–8. Blatt – Rispenstängel – Maiszünsler *Ostrinia nubilalis*, Baumwollkapselwurm *Helicoverpa armigera*

Blüte – Milchreife – Stängelfäule *Fusarium sp.*, Blattdürre *Helminthosporium turcicum*

Milchreife – Vollreife – *Kolbenfusariose*

Raps

Keimblätter – Rosettenbildung – Kohlerdföhe der Gattung *Phyllotreta*: Großer Rapserrdflohe (*Phyllotreta atra* L.), Gebänderter Kohlerdflohe (*Phyllotreta undulata* Kutsch.) und andere, Rapserrdflohe (*Psylliodes chrysocephala* L.), Rapsblatwespe (*Athalia rosae* Christ.), Rapserrdflohekäfer (*Entomoscelis adonidis* Pall.).

Streckungswachstum – Bildung von Blütenschossen - Kohlwanze (*Eurydema ornata* L.), Gemüsewanze (*Eurydema oleraceum* L.), Großer Kohlweißling (*Pieris brassicae* L.), Kleiner Kohlweißling (*Pieris rapae* L.), Kohlleule (*Mamestra brassicae* L.), Samenrüssler der Gattung *Ceutorhynchus*.

Knospenbildung – Blüte_- Rapsglanzkäfer (*Meligethes aeneus* F.), Behaarter Rosenkäfer (*Tropinota hirta* Poda.), Samenrüssler der Gattung *Ceutorhynchus*: Rapssaatstecher (*Ceutorhynchus napi* Gyll.), Kohlschotenrüssler (*Ceutorhynchus pallidactylus* (Marsh.) (synonym *Ceutorhynchus quadridens*).

Schotenbildung – Kohlschotenschrötzer (*Ceutorhynchus assimilis* Payk.), Mehliges Kohlblattlaus (*Brevicoryne brassicae* L.), Kohlschotenmücke (*Dasineura brassicae* Winn.).

Überwachen Sie die Bestände und ergreifen Sie rechtzeitig Maßnahmen!