

Anfang April ist eine aktive Entwicklung der Vegetationsprozesse in landwirtschaftlichen Kulturen zu beobachten.

Автор(и): Растителна защита

Дата: 01.04.2021 *Брой:* 4/2021



Trotz des erwarteten Schneefalls in den Bergen und der vorhergesagten Abkühlung zu Beginn des Aprils werden die agrometeorologischen Bedingungen von durchschnittlichen Tagestemperaturwerten bestimmt, die einen aktiven Verlauf der Vegetationsprozesse in landwirtschaftlichen Kulturen ermöglichen. Für Anfang April werden keine kritischen Minimaltemperaturen für die Obstarten prognostiziert, die in ihrer phänologischen Entwicklung fortgeschritten sind.

In diesem Zeitraum werden sich Weizen und Gerste in Südbulgarien im Stadium des Schossen befinden. In den Kulturen der Donauebene werden die Stadien der Bestockung, der Übergang zum Schossen und der Beginn des Schossens auftreten. Bei den Obstarten werden die beobachteten phänologischen Phasen der Knospenaufbruch, das Knospen und die Blüte sein. Bei der Rebe werden Saftfluss und Knospenschwellen stattfinden.

Während des Zeitraums werden Bedingungen für die Durchführung der saisonalen agrotechnischen Arbeiten geschaffen – die Aussaat von Sonnenblumen und die Voraussaat-Bodenbearbeitung für Frühjahrskulturen. In den Dauerkulturen werden die Behandlungen gegen Schorf bei Kernobst, gegen die Blütenfäule (Frühbraunfäule) und die Schrotschusskrankheit bei Steinobst sowie die Kräuselkrankheit beim Pfirsich fortgesetzt. Um die maximale Wirkung der Spritzung zu erzielen, sollten Pflanzenschutzmaßnahmen bei ruhigem Wetter mit einer zulässigen Windgeschwindigkeit von bis zu 2–3 m/s durchgeführt werden.

Die vorhergesagten Niederschläge in den ersten Tagen des Zeitraums werden die Möglichkeiten zur Durchführung agrotechnischer Tätigkeiten vorübergehend einschränken.

Quelle: NIMH