

Agrometeorologische Vorhersage für den Zeitraum 18. bis 24. Februar

Автор(и): Растителна защита
Дата: 23.02.2022 Брой: 2/2022



Die überdurchschnittlichen Temperaturen im vergangenen Zeitraum, mit Höchstwerten über 16-17°C in vielen Landesteilen, unterbrachen die Winterruhe der herbstgesäten Kulturen und lösten eine vorzeitige Entwicklung bei einigen frühblühenden Obstsorten (Mandel, Aprikose, Pfirsich) in Teilen der Donauebene (Agrometeorologische Station Pavlikeni) und in den südlichen Regionen (Petrich, Sandanski) aus.

In der ersten Hälfte der nächsten Siebentageperiode werden die agrometeorologischen Bedingungen erneut von für die Jahreszeit hohen Temperaturen bestimmt, was die Vegetationsprozesse in den Wintergetreidekulturen und den mehrjährigen Plantagen wieder aufnehmen und intensivieren wird. Zu Beginn

des dritten Februardrittels wird das dritte Blattwachstumsstadium beim Weizen vorherrschen. Ein geringerer Teil der Bestände befindet sich im Bestockungsstadium.

In den letzten Tagen der Periode ist ein deutlicher Temperaturrückgang vorhergesagt, jedoch ohne kritische Mindestwerte für landwirtschaftliche Kulturen. Auf den Feldflächen werden die durchschnittlichen Tagestemperaturen am Ende der Periode nahe dem biologischen Minimum liegen, das für die Vegetation der Wintergetreidekulturen erforderlich ist.

Welche Hauptkrankheiten werden durch die Winterspritzung im Obstgarten bekämpft

Während der Periode wird bei den Steinobstarten eine Knospenschwellung zu beobachten sein. Das Intervall zwischen den Stadien der Knospenschwellung und des Knospenaufbruchs ist ein Zeitraum, in dem die vorbeugende Spritzung von Obstbäumen mit kupferhaltigen Fungiziden nicht ausgelassen werden sollte. Diese Behandlungen sind von außerordentlicher Bedeutung für die Reduzierung von Infektionen durch überwinternde Krankheitserreger: Blütenfäule (Frühbraunfäule), Kräuselkrankheit beim Pfirsich, Schrotschusskrankheit (Kirsche, Aprikose, Pflaume) usw. Günstigere Bedingungen für die Durchführung von Pflanzenschutzspritzungen in Obstgärten, für die mineralische Stickstoffdüngung von Winterkulturen und für die Vorsaadbodenbearbeitung von Flächen, die für die Aussaat von Frühjahrsfrühkulturen vorgesehen sind, werden zu Beginn der Periode auftreten.

Quelle NIMH