


# Ende März – Bedingungen für die Durchführung saisonaler agrotechnischer Maßnahmen

Автор(и): Растителна защита  
Дата: 30.03.2022 Брой: 3/2022



In der letzten Märzwoche wird ein deutlicher Temperaturanstieg und eine anhaltende Aktivierung der Vegetationsprozesse in den herbstausgesäten Kulturen prognostiziert.

In diesem Zeitraum werden die Wintergetreidebestände überwiegend im Bestockungsstadium sein. Nur an vereinzelten Standorten, in den agrometeorologischen Stationen von Haskovo, Chirpan und Kazanlak, wird sich Weizen im Dreiblattstadium befinden. In den Dauerkulturen werden Knospenschwellen und Knospenaufbruch erfolgen, und in bestimmten Regionen werden die in ihrer Entwicklung am weitesten fortgeschrittenen Steinobstarten sich im Stadium der Blütenknospe und des Blühbeginns befinden.

---

## Die Vorblüte-Spritzung – ein Schlüsselement für den Gesundheitszustand von Obstbäumen

---

An den meisten Tagen des Zeitraums wird relativ trockenes Wetter vorhergesagt, was Gelegenheit zur Durchführung saisonaler agrotechnischer Maßnahmen bietet – der Bodenbearbeitung vor der Aussaat und der Aussaat von Frühjahrskulturen, der Kontrolle der herbstausgesäten Kulturen auf Unkrautbefall und Schädlinge. Die Bedingungen werden geeignet sein, um in Dauerkulturen Pflanzenschutzspritzungen vor der Blüte gegen einige überwinternde Pathogene und Schädlinge durchzuführen – gegen Schorf bei Kernobstarten, gegen Schrotschusskrankheit bei Steinobst, sowie gegen die besonders gefährliche Rote Spinne (Obstbaumspeinnmilbe) in allen Obstbäumen und Weinbergen.

Der Zeitraum fällt mit der optimalen agrotechnischen Aussaatzeit für Sonnenblumen in den Regionen der Donauebene zusammen.