

# Pflanzenschutzpflege für den Weinstock im Mai

Автор(и): Растителна защита  
Дата: 10.05.2022 Брой: 5/2022



In dieser Periode befinden sich die Reben von der Phänophase „*Knospenschwellen*“ bis zum Erscheinen der „*ersten Blütenstände*“.

## Echter Mehltau (Oidium)

Der Erreger überwintert als Myzel in den Knospen und an den Trieben, das sich ab einer Temperatur von 6,2 °C zu entwickeln beginnt. Echter Mehltau befällt alle grünen Pflanzenteile – Blätter, Triebe, Blütenstände und Beeren.

---

## Echter Mehltau (Oidium)

## Bekämpfungsstrategie

Bei Symptombefall an den Trieben wird die erste Spritzung in der Phänophase „grüner Trieb (Schmetterling)“ oder bei einer Trieblänge von 6-8 cm durchgeführt.

**Zugelassene Pflanzenschutzmittel:** Acidal WG - 0,25%; Vivando - 20 ml/da; Dinali 090 DC - 50-65 ml/da; Domark 10 EC - 25-30 ml/da; Cabrio Top - 0,2%; Orius 25 EW/Dynasty 25 EW/Tebumax 25 EW - 0,04%; Talendo 20 EC - 20-25 ml/da; Talendo Extra - 7,5-25 ml/da; Thiovit Jet 80 WG - 0,3%; Flint Max 75 WG - 0,016%; Folicur 250 EW/Horizont - 0,04%; Folpan 80 WDG - 0,15%; Sercadis - 15 ml/da; Luna Experience - 12-40 ml/da; Kumulus DF - 200-300 g/da; Sonata SC - 500 ml/da; Topas 100 EC - 30 ml/100 l Spritzbrühe.

## Reben sind nach dem Knospenschwellen am anfälligsten für Rindennekrose (Excoriose)

### Rindennekrose der Rebe (Excoriose)

In einem kühlen und feuchten Frühjahr entwickelt sich die Krankheit stark. Aus befallenen Knospen treiben die Triebe später aus und haben verkürzte Internodien, während die Blätter klein und deformiert sind. Die Symptome an den grünen Trieben sind: dunkle, punktförmige Schwellungen, die sich zu größeren, dunkelbraunen, länglichen Flecken vergrößern. Die kritische Periode für die Krankheitsentwicklung ist vom „Knospenschwellen“ bis zur Phänophase „3. - 4. Blatt“.

### Bekämpfungsstrategie

Die erste Behandlung wird durchgeführt, wenn sich 30-40% der Knospen in der Phänophase von „grüner Trieb (Schmetterling)“ bis „erstes Blatt getrennt“ befinden. In einem kühlen und regnerischen Frühjahr wird eine zweite Spritzung durchgeführt, wenn 30-40% der Knospen an der Triebbasis in der Phänophase „zweites-drittes Blatt“ sind. Die nachfolgenden Behandlungen fallen mit den Spritzungen gegen Falschen Mehltau und Echten Mehltau im Weinberg zusammen.

**Zugelassene Pflanzenschutzmittel:** Mikal Flash - 0,3%; Momentum Extra WG - 300 g/da; Solofol - 188 g/da; Thiovit Jet 80 WG - 1250 g/da; Follow 80 WG/Freeler 80 WG/Flowet 80 WG - 187,5 g/da; Kumulus DF - 750 g/da; Delan 700 WDG - 50 g/da; Quadris 25 SC - 0,075-0,1% (75-100 ml/da bei 100 l/da Spritzbrühe); Microthiol Special Liquid – 1210 ml/da;



## Einbindiger Traubenwickler

Ende April beginnt der Flug der Falter der überwinterten Generation und der Beginn der Eiablage. Je nach Temperatur schlüpfen die Eier nach 4-10 Tagen.

---

## Einbindiger Traubenwickler (*Lobesia botrana*)

---

### Bekämpfungsstrategie

Die Behandlung sollte beim **ES** (wirtschaftlichen Schadensschwellenwert) durchgeführt werden – für Tafeltraubensorten *4-6 Eier oder Larven/100 Blütenstände* und für Weinsorten – *6-8 Eier oder Larven/100 Blütenstände*.

**Zugelassene Pflanzenschutzmittel:** Aphicar 100 EC - 40 ml/da; Decis 100 EC - 12,5-17,5 ml/da; Dipel 2 X - 0,1%; Efcymertrin 10 EC/Tsiper 10 - 40 ml/da; Karate Zeon 5 CS - 0,02%; Coragen 20 SC/Voliam – 15-27 ml/da (Weinberge – Weinsorten) und 15-21,6 ml/da (Weinberge – Tafelsorten); Mageos - 10 g/da; Rapax - 75-100 ml/da; Sumi Alpha 5 EC/Sumicidin 5 EC - 0,025%; Foray 48 B - 0,15%; Cyclone 10 EC - 40 ml/da; Citrin Max/Cyperkill 500 EC/Cypert 500 EC/Poly 500 EC - 6 ml/da; Sherpa 100 EC - 40 ml/da, Delmur - 50 ml/da, Kedu - 40 ml/da.





## Pockenmilbe der Rebe

Schäden werden durch die Larven und adulten Milben verursacht, die an der Blattunterseite und seltener an der Blattoberseite Pflanzensaft saugen. An den Saugstellen kommt es durch von den Milben abgesonderte Enzyme zu Gewebewucherungen und Deformationen. Es bilden sich Pocken (Gallen), die auf der Unterseite konkav und auf der Oberseite konvex sind.

---

## Pockenmilbe der Rebe

---

### Bekämpfungsstrategie

Die Spritzung wird bei einer Trieblänge von 6-8 cm durchgeführt, wenn die Milben aktiv werden und auf die jungen Blätter wandern, bevor diese Pocken gebildet haben.

**Zugelassene Pflanzenschutzmittel:** Kumulus DF - 1250 g/da; Microthiol Special Liquid – 1930 ml/da; Thiovit Jet 80 WG - 1500 g/da; Heliosoufre C – 750 ml/da, Apollo 50 SC – 30-40 ml/da, Shirood (ehemals Masai WP) – 25 g/da.

