

Ende Februar und Anfang März – eine für die Aussaat von Karotten und Steckzwiebeln geeignete Zeit

Автор(и): Растителна защита

Дата: 28.02.2023 Брой: 2/2023



An den meisten Tagen im Zeitraum Ende Februar/Anfang März werden die agrometeorologischen Bedingungen weiterhin von überdurchschnittlichen Temperaturen bestimmt, die die Vegetationsprozesse in den Wintergetreidekulturen aktiv halten.

Bei Weizen und Gerste werden die Wachstumsstadien des dritten Blattes und der Bestockung beobachtet. Bei Steinobstarten wird das vorherrschende Stadium die Massenschwellung der Knospen sein.

Gegen Ende des Zeitraums wird ein Temperaturrückgang vorhergesagt, wobei ihre durchschnittlichen Tageswerte nahe am biologischen Minimum liegen werden, das für die Vegetation von Wintergetreide erforderlich ist.

Günstigere Bedingungen für die Kopfdüngung herbstgesäter Kulturen mit Stickstoffmineraldüngern, für die Durchführung der saisonalen Bodenbearbeitung und für den Schnitt in Obstplantagen und Weinbergen werden Ende Februar eintreten.

Die vorhergesagten Niederschläge Ende Februar und Anfang März werden Pflanzenschutzspritzungen bei Steinobstarten gegen die Kräuselkrankheit des Pfirsichs, die Frühfäule und die Schrotschusskrankheit verschieben. Der Zeitraum wird für das Pflanzen von Steckzwiebeln sowie die Aussaat von Spinat und Karotten geeignet sein.

Quelle: NIMH