

Instabile und dynamische agrometeorologische Bedingungen Ende März

Автор(и): Растителна защита
Дата: 28.03.2023 Брой: 3/2023



Ende März werden die agrometeorologischen Bedingungen durch eine erhöhte Dynamik gekennzeichnet sein. In der ersten Hälfte des Zeitraums werden überdurchschnittliche Temperaturen und eine Aktivierung der Vegetationsprozesse bei den herbstausgesäten Kulturen und den mehrjährigen Plantagen vorhergesagt. Beim Weizen wird die Bestockungsphase in großem Umfang einsetzen. Stellenweise in der Donauebene und in den südlichen Regionen wird auch der Beginn des Schossen-Stadiums bei den Wintergetreidekulturen beobachtet werden (Agrometeorologische Stationen: Novachene, Silistra, Haskovo).

Ende des Monats werden sich die agrometeorologischen Bedingungen wesentlich ändern. In den letzten Märztagen werden sie durch Temperaturen unterhalb der klimatischen Normen bestimmt, nahe am biologischen

Minimum, das für die Vegetation der herbstausgesäten Kulturen und der ausgesäten Frühjahrskulturen erforderlich ist. In den nordöstlichen Regionen und in den Hochlagen besteht eine vorhergesagte Wahrscheinlichkeit für Niederschläge, einschließlich Schnee, und ein Risiko für Schäden an Steinobstarten, die in die Blütephase eingetreten sind.

Der erwartete Niederschlag in der letzten Märzwoche wird die Bodenfeuchtereserven in der 50-cm-Schicht verbessern. Ende der zweiten Märzdekade war in Teilen der südlichen und östlichen Regionen der Stand der Bodenfeuchtereserven bei Wintergetreide in den 50- und 100-cm-Bodenschichten für den Beginn der Frühlingsvegetationsperiode niedrig, stellenweise unter 65% der Feldkapazität (FK). Verhältnismäßig gute Reserven, über 85% der FK, wurden bei den herbstausgesäten Kulturen in den nordwestlichen Regionen des Landes verzeichnet (Agrometeorologische Stationen: Bazovets, Nikolaevo, Novachene, Borima).

An den meisten Tagen der nächsten Periode wird das vorhergesagte instabile Wetter mit häufigen Niederschlägen die Durchführung von Pflanzenschutzspritzungen in Obstanlagen, die vor der Aussaat erforderliche Bodenbearbeitung und die Aussaat von mittelfrühen Frühjahrskulturen behindern.

Mitte der dritten Märzdekade (25.03.–05.04.) beginnt in der Donauebene der agrotechnische Zeitraum für die Sonnenblumenaussaat.

Quelle: NIMH