

Zorvec™ Vinabel™ - eine Revolution in der Bekämpfung von Falschem Mehltau im Weinbau

Автор(и): Corteva Agriscience™
Дата: 07.06.2023 Брой: 6/2023



Wie lange ist es her, seit Sie die Worte gehört haben – Ein neues Fungizid gegen Falschen Mehltau im Weinbau, mit kombinierter vollsystemischer, lokal systemischer, translaminarer, kontakt-, kurativer und protektiver Wirkung. Seit Jahrzehnten bekämpfen bulgarische Winzer den Falschen Mehltau mit Pflanzenschutzmitteln, die keinen neuen Ansatz für eine zuverlässige Krankheitskontrolle bieten.

Nun, diese Zeit ist jetzt gekommen und auf dem Markt finden Sie **Zorvec™ Vinabel™**. Es enthält den neuesten Wirkstoff **Zorvec™ (Oxathiapiprolin)**, der der erste seiner Art aus einer neuen Klasse von Fungiziden mit einer beispiellosen Wirkung gegen Falsche Mehltäupilze, verursacht durch pilzliche Pathogene der Klasse Oomyceten, ist. **Zorvec™ Vinabel™** ist eine fungizide Kombination mit kombinierter systemischer, lokal

systemischer, translaminarer, kontakt-, kurativer und protektiver Wirkung, die eine sichere, zuverlässige und lang anhaltende Kontrolle des Falschen Mehltaus auch unter höchstem Infektionsdruck gewährleistet. **Zorvec™ Vinabel™** wirkt in mehreren Phasen des Lebenszyklus des Pathogens und ist auf diese Weise wirksamer als andere Produkte, sowohl bei der Bekämpfung des Falschen Mehltaus als auch in der Dauer des Schutzes.

Zorvec™ Vinabel™ bietet einen außergewöhnlichen Schutz der Blattmasse und des Neuaustriebs für eine bessere Entwicklung und Gesundheitszustand der Weinberge, was zu einer profitableren Produktion führt. **Zorvec™ Vinabel™** unterbindet die Entwicklung der Krankheit, was hilft, hochwertige Erzeugnisse zu erhalten. Es wird empfohlen, **Zorvec™ Vinabel™** präventiv in einer Abfolge von zwei Spritzungen im Abstand von 15 Tagen anzuwenden. Diese beiden Behandlungen bieten bis zu 30 Tage Schutz für die Kultur in ihrer empfindlichsten Entwicklungsphase (vom Beginn der Blüte bis zur Beerenbildung), wenn der Traubenertrag bestimmt wird.

Zorvec™ Vinabel™ wird sehr schnell aufgenommen – bis zu 20 Minuten nach der Spritzung durch die Oberflächenepidermis der Blätter sowie innerlich (Parenchymgewebe). **Zorvec™ Vinabel™** wird 20 Minuten nach der Behandlung nicht abgewaschen. Dies hilft Landwirten, Nachbehandlungen zu vermeiden, wenn es mehr als 20 Minuten nach der Spritzung regnet. Die Bewegung/Translokation von **Zorvec™ Vinabel™** von behandelten zu unbehandelten Teilen hilft, unbehandelte Trauben und Blätter, einschließlich des Neuaustriebs zwischen zwei Spritzungen, zu schützen. Dies wird durch eine optimale Benetzung der Blattmasse in den kritischen Stadien der Kulturentwicklung gewährleistet. Dies gibt Winzern mehr Sicherheit, Ruhe und freie Zeit, um sich mit anderen Angelegenheiten im Weinberg zu befassen.

Wie zeichnet sich **Zorvec™ Vinabel™** aus und wie wird es Winzern nutzen?

- Ein neues Fungizid, bereits erfolgreich in der Praxis etabliert (zum Beispiel in Italien)
- Enthält den neuesten Wirkstoff (**Zorvec™/Oxathiapiprolin**) mit einer völlig neuen und anderen Wirkungsweise im Vergleich zu analogen, bisher in der Praxis verwendeten Fungiziden, und einen zweiten Wirkstoff (Zoxamid) mit lokal systemischer Wirkung
- Mit kombinierter vollsystemischer, lokal systemischer, translaminarer, kontakt-, kurativer und protektiver Wirkung
- Die kombinierte und unterschiedliche Wirkungsweise der Wirkstoffe gewährleistet die Kontrolle des Falschen Mehltaus, auch in den kritischsten Stadien der Rebe (vom Beginn der Blüte bis zur Beerenbildung), und

vermeidet das Risiko von Pathogenresistenzen

- Synergismus und sich gegenseitig ergänzende Wirkung der Wirkstoffe
- Bietet eine 3–4 Tage längere Kontrolle des Falschen Mehltaus als Konkurrenzprodukte
- Ermöglicht eine vollständige Kontrolle des Falschen Mehltaus mit einer niedrigen Dosis pro Dekar (2 Gramm Wirkstoff pro Dekar, im Gegensatz zu konkurrierenden analogen Wirkstoffen – Metalaxyl-M, Benalaxyl, Metalaxyl, Fosetyl-Aluminium, bei denen die Dosis von 10 bis 130 Gramm Wirkstoff pro Dekar beträgt)
- Sehr schnelle Aufnahme des Fungizids nach der Behandlung – bis zu 20 Minuten. Wird durch Regen, der 20 Minuten nach der Spritzung fällt, nicht abgewaschen
- Hochwertige flüssige Suspo-Emulsions-Formulierung (ölbasiert), die eine schnellere Haftung, Aufnahme und den Transport zu allen Wachstumspunkten erleichtert – gewährleistet eine zuverlässige Kontrolle gegen Falschen Mehltau
- Schützt Neuaustrieb zwischen zwei Behandlungen erfolgreich
- Keine Kreuzresistenz mit derzeit in der Praxis verwendeten Produkten
- Niedrige Aufwandmenge (50 ml/da gebrauchsfertiges Produkt) – geringere Transport- und Lagerkosten
- Beeinträchtigt die Produktqualität nicht negativ
- Beeinträchtigt die Gärungsprozesse bei der Weinherstellung nicht negativ
- Erfüllt die höchsten Kriterien und Anforderungen an die Höchstmengen für Rückstände (MRL) in den erzeugten Trauben

Die allgemeine Schlussfolgerung ist, dass **Zorvec™ Vinabel™** dank der 15 aufgeführten, getesteten und unter realen praktischen Bedingungen in kommerziellen Weinbergen in wichtigen weinbautreibenden Ländern, einschließlich Bulgarien, bewiesenen praktischen Vorteile auf einem qualitativ höheren Niveau für die Kontrolle des Falschen Mehltaus steht.

Auch der Slogan des Fungizids ist kein Zufall – ES VERÄNDERT ALLES.

Wir bei Corteva Agriscience empfehlen Ihnen, **Zorvec™ Vinabel™** in Ihr Programm zur Bekämpfung des Falschen Mehltaus aufzunehmen, und wir sind überzeugt, dass Sie mit seiner Wirkung zufrieden sein werden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die regionalen Vertreter von Corteva Agriscience und besuchen Sie www.corteva.bg